



Mi Universidad

Investigación

Nombre del Alumno: MARGARITA JIMÉNEZ GUILLEN,

Nombre del tema : AINES

Parcial :2

Nombre de la Materia: Farmacología

Nombre del profesor: José Mauricio Padilla Gómez

Nombre de la Licenciatura: MVZ

Cuatrimestre: 3

Paciente: Perra mestiza, 7 años, 23 kg.

Síntoma principal: Cojera intermitente en miembro posterior derecho, sin fiebre ni signos sistémicos.

Antecedentes: Gastritis hace 3 meses.

Duración de la cojera: 2 semanas, empeora en clima frío.

¿Qué tipo de antiinflamatorio sería más adecuado en este caso: ¿AINE o esteroide? ¿Por qué?

En este caso un aine sería lo indicado ya que es (antiinflamatorio no esteroideo)

Ya que la paciente no presenta ninguna infección ni algún virus Además, los Aines son eficaces en el manejo del dolor músculo-esquelético como la cojera.

Menciona un fármaco específico que usarías y justifica su elección.

Carprofeno

Es un AINE y tiene buena eficacia para dolor osteoarticular y menor incidencia de efectos gástricos

¿Qué precauciones clínicas debes tomar antes de administrar ese fármaco?

Realizar un examen físico completo.

Realizar un hemograma y perfil bioquímico

Administrar con alimento para reducir irritación gástrica.

Observar por signos de intolerancia gastrointestinal.

¿Cuál sería el riesgo principal si eligieras un esteroide en este caso?

Reagudización de la gastritis o incluso una úlcera gástrica, ya que los esteroides tienen mayor efecto ulcerogénico, sobre todo si hay antecedentes digestivos.

Si decidieras usar un AINE, ¿qué alternativa ofrecerías en caso de antecedentes gástricos?

Medicamento para proteger el estomago como Omeprazol

¿Por qué no debe combinarse un AINE y un esteroide en el mismo tratamiento?

Porque aumenta el riesgo de efectos gastrointestinales adversos, como gastritis, úlceras y hemorragias.

¿Qué signos adversos deben monitorearse durante el tratamiento?

Vómitos o diarrea.

Letargia, anorexia.

Dolor abdominal.

Signos de deshidratación.



Clinica veterinaria



Dra. Margarita Jimenez Guillen

Medico Veterinario
C.P. 12345

1234-5678

hola@sitioincreible.com

Calle, las flores, 12



PACIENTE: CANINO, 7 AÑOS, 23 KG

FECHA: 22/05/2025

SINTOMAS : COJERA INTERMITENTE EN MIEMBRO POSTERIOR DERECHO , SIN FIEBRE NI SIGNOS SISTEMATICOS

LLEVA 2 SEMANAS, EMPEORANDO EN CLIMA FRIO

ANTECEDENTES: GATRITIS HACE 3 MESES

- CARPROFENO 25 MG/ML
- DOSIS: 4.4 MG/KG CADA 24 H
- ADMINISTRACIÓN: VÍA ORAL, CON ALIMENTO
- FRECUENCIA: 1 VEZ AL DÍA
- DURACIÓN: 5 DÍAS, REEVALUAR AL 5° DÍA

MEDICAMENTO ADICIONAL:

- OMEPRAZOL 1 MG/KG CADA 24 H POR 5 DÍAS
- VÍA: ORAL, 30 MIN ANTES DEL ALIMENTO

Dra. Margarita Guillen
MÉDICO VETERINARIO

