



CASO CLINICO

Nombre del Alumno: MIGUEL ANGEL MOLINA GONZALEZ

Nombre del tema: CASO CLINICO

Parcial : 2

Nombre de la Materia :FARMACOLOGIA Y VETERINARIA

Nombre del profesor:JOSE MAURICIO PADILLA GOMEZ

Nombre de la Licenciatura : MEDICINA VETERINARIA Y ZOOCTENIA

Cuatrimestre: 3

Caso clínico

Una perra mestiza de 7 años, 23 kg de peso, es llevada a consulta con signos de cojera intermitente en miembro posterior derecho, sin fiebre ni signos sistémicos. Tiene antecedentes de gastritis hace 3 meses y actualmente no toma ningún medicamento. La dueña comenta que el problema de la cojera se presenta desde hace 2 semanas, sobre todo en climas fríos.

Preguntas:

¿Qué tipo de antiinflamatorio sería más adecuado en este caso: AINE o esteroide? ¿Por qué?

UTILIZARIA UN INHIBIDOR SELECTIVO DE LAS COX-2 O COX-1 , POR QUE EL ESTEROIDE LE DA PROBLEMAS GASTROINTESTINALES COMO POR EJEMPLO UNA ULCERA EN CAMBIO LOS AINES COX-2 SELECTIVOS DAN UN PERFIL DE SEGURIDAD MEJORADO ESPECIFICAMENTE EN EL TRACTO DIGESTIVO

Menciona un fármaco específico que usarías y justifica su elección.

FIROCOXIB INHIBIDOR SELECTIVO DE LA COX-2 , YA QUE ESTE ES UN ANTIFLAMATORIO QUE NO ES UN ESTEROIDE Y ESTE ES UN AUXILIAR EN EL DOLOR Y OFRECE UNA MAYOR SEGURIDAD AL UTILIZARLO Y YA QUE ESTOS COX-2 SON PREFERIBLES USARLOS EN CASOS DE RIESGO GASTROINTESTINALES

¿Qué precauciones clínicas debes tomar antes de administrar ese fármaco?

EDAD , CONDICION CLINICA , Y ESPECIE DEL ANIMAL .

¿Cuál sería el riesgo principal si eligieras un esteroide en este caso?

TRANSTORNOS GASTROINTESTINALES , ALTERACIONES RENALES , HEPATOXICIDAD ,TRANSTORNOS HEMATOLOGICOS

Si decidieras usar un AINE, ¿qué alternativa ofrecerías en caso de antecedentes gástricos?

UN ROBENACOXIB YA QUE ESTE ES UN COX-2 SELECTIVO QUE ESTA PERMITIDO Y ESTUDIADO POR CINETIFICOS

¿Por qué no debe combinarse un AINE y un esteroide en este mismo tratamiento?

POR QUE ESTE PUEDE AUMENTAR EL RIESGO DE PROBLEMAS GASTROINTESTINALES

¿Qué signos adversos deben monitorearse durante el tratamiento?

diarrea (la más común) ,vómitos ,falta de apetito ,pérdida de peso

Redacta una receta médica simulada para este caso (nombre del fármaco, dosis, vía, frecuencia, duración).
APLICAR 2 MG DE DECORAXIB UNA VEZ AL DIA POR 4 DIAS PARA LA INFLAMACION