

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Erika Alexandra Pérez Méndez.

Parcial: 4


Nombre de la Materia: Zootecnia de Porcinos.

Nombre del Maestro: Gonzalo Rodríguez Rodríguez.

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cuatrimestre: 6

SUPER NOTA



ZOOTECNIA DE PORCINOS



ALIMENTACIÓN

Procedimiento mediante el cual se proporciona a los cerdos una dieta adecuada y balanceada para satisfacer sus necesidades nutricionales en cada etapa de su vida.

Componentes principales de la alimentación


→ Energía.

→ Proteína.

→ Vitaminas.

→ Minerales.

→ Agua limpia.



MATERIAS PRIMAS

Son de origen animal que se usan como base de la elaboración de alimentos balanceados. Aportan nutrientes, energía, proteínas, fibra, vitaminas y minerales.



 Ejemplo: Maíz, sorgo, harina de soya, pescado, carne, hueso y sales minerales.

SUBPRODUCTOS

Son residuos aprovechables de procesos agroindustriales, como salvado de trigo, melaza, torta de soya, y suero de leche. Que ofrecen valor nutricional y ayudan a reducir costos.



AGUA

Nutriente esencial y vital para su salud, crecimiento, producción y bienestar del cerdo.

Tiene un acceso a ella las 24 horas. Bebiendo 3 galones de agua por día.



→ En cerdos en crecimiento beben entre 500-1.000 L/min

→ Cerdas en lactación entre 1.000 y 2.000 L/min.

ALIMENTACIÓN DE PRODUCTORES

Fundamental para asegurar la salud, fertilidad y productividad en cerdos y cerdas.



Recomendaciones

Aumentar las raciones cuando haiga climas fríos.

Alimentar a los cerdos dos veces al día ejm. 7:00 AM y luego a las 5:00 PM.

ALIMENTACIÓN EN GESTACIÓN




Para el buen rendimiento de los lechones y de la cerda en partos posteriores.

La cantidad de alimento de la cerda depende de la etapa de gestación.

Tabla de alimentación para cerdas gestantes

Etapas de la gestación	Consumo de alimento por día (kg)
De la monta al quinto día de gestación	1,5 kilos
Del quinto día al día 90	2-2,5 kilos
Del día 90 hasta el día del parto	3-3,5 kilos



ALIMENTACIÓN EN LACTANCIA

Se debe permitir a las cerdas que consuman si son primerizas de 5,5 a 6 kg por día y si son adultas de 6 a 7 kg por día.



Debe ser repartido de 4 a 6 veces por día y en zonas calientes darlo a las horas más frescas.



Cuando la cerda tiene menos de 8 lechones se debe dar 2 kg a ella y 0,5 kg por lechón.

