NOMBRE DEL ALUMNO: VANESSA GERALDIN FLORES DE LEÓN..

MATERIA: ENFERMERIA CLINICA

NOMBRE DEL PROFESOR: : MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

LICENCIATURA: ENFERMERÍA

LINEAS INTRAVENOSAS

Vías intravenosas periféricas

Son catéteres cortos colocados en venas superficiales de brazos, manos o pies, utilizados para tratamientos a corto plazo.

¿Para que se usa?

- Administración de líquidos.
- Administración de medicamentos.
- Administración de sangre.
- Extracción de muestras de sangre.

Catéteres venosos centrales

Se insertan en venas más grandes y profundas, como la vena cava superior, y se utilizan para tratamientos más prolongados, administración de medicamentos irritantes o nutrición parenteral total.

¿Para que se usa?

- Administración de medicamentos.
- Nutrición parenteral.
- Transfusiones de sangre.
- Extracción de muestras de sangre.
- Monitoreo hemodinámico.

Catéteres de línea media

Son catéteres largos que se insertan en venas periféricas más grandes y pueden permanecer colocados por varias semanas.

¿Para que se usa?

- Tratamientos prolongados.
- Acceso venoso difícil.
- Alternativa a catéteres centrales.
- Infusión de fármacos compatibles