Nombre del Alumno: Clara Luz Gonzalez Lopez

Nombre del tema: Transfusión de hemoderivados

Nombre de la Materia: Práctica clínica I

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6to

Parcial: I

TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS

DEFINICION DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS

1. La terapia transfusional puede ser una intervención que salva la vida o mejora rápidamente una condición grave
2. como todo tratamiento puede conllevar a complicaciones agudas o tardías
3. además incluye riesgos infecciosos que pueden tener consecuencias graves o mortales a pesar de los estrictos controles que anteceden a la transfusión.

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA

1. Todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente.

TERAPIA TRANSFUNCIONAL

1. Procedimiento terapéutico consistente en la administración de sangre o componentes sanguíneos a un ser humano.
2. La intervención de enfermería en la terapia transfusional, incluye la administración de los componentes sanguíneos y la monitorización de la respuesta del paciente.
3. SEGURIDAD: Conjunto de procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos.

Factores de riesgo que debe considerar el personal de enfermería para identificar de manera oportuna reacciones transfusionales

3

Estrategias para prevenir los errores relacionados con la administración de elementos sanguíneos en pacientes

1. Aplicar los principios científicos que fundamenten la acción de enfermería, para prevenir y reducir riesgos
2. Capacitar al personal encargado de transfundir elementos sanguíneos.
3. Revisar las indicaciones médicas para confirmar la prescripción de la transfusión y la forma en que ha de realizarse
4. Componente
   Cantidad
   Velocidad de transfusión
   Tipo de filtro
   Y si se ha de administrar alguna premedicación.

Antes de la transfusión

1. Verificar la existencia del consentimiento informado del paciente o familiar
2. Realizar la identificación y verificación de la calidad del componente sanguíneo conjuntamente con el médico
3. Confirmar la compatibilidad sanguínea con la hoja de solicitud
   - Confrontar las papeletas con el formato de solicitud (nombre completo del paciente, numero de celula y tipo de sangre
   - Revisar en forma detallada el componente sanguíneo

Durante de la transfusion

1. Regular el goteo inicialmente a 30 gotas por minuto y observar la presencia de alguna manifestación clínica de reacción
2. No mezclar el hemocomponente con ningún fármaco o fluido de reposición, con excepción de solución salina al 0.9%
3. Orientar al paciente sobre los signos y síntomas de una reacción transfusional (ansiedad, escalofríos, cefalea, prurito, mareo, náuseas
4. Monitorizar el sitio de punción intravenosa para saber si hay signos de infiltración o flebitis.

Posterior a la transfusion

- Tomar y registrar los signos vitales.
- Vigilar la aparición de signos clínicos de reacción transfusional (escalofríos, cefalea, prurito, mareo
- Registrar la administración del hemocomponente, cantidad y tiempo de administración,

Objetivos

- Asegurar la administración de hemoderivados con seguridad para el paciente, detectando y evitando los posibles errores.
- Administrar el hemocomponente indicado, en tiempo y forma adecuados para cada caso, detectando en forma precoz cualquier reacción adversa.

Presented with xmind