



Tema:

Época, neumonía y tuberculosis

Nombre de la materia:

Enfermería Gerontogeriatrica

Nombre del profesor:

Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Nombre de la alumna:

Andy Michel Velázquez Sáenz

Grado: 6to

Grupo: 'A'

Neumonía y Tuberculosis

EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)

Clinica

- Tos crónica.
- Disnea progresiva.
- Expectoración.
- Sibilancias.
- Cianosis en casos avanzados.

Tratamiento

- Broncodilatadores (SABA/LABA).
- Corticoides inhalados en casos moderados-severos.
- Antibióticos en exacerbaciones.
- Rehabilitación pulmonar.

Prevención

- Suspender el tabaquismo.
- Vacunación antigripal y antineumocócica.
- Evitar exposición laboral a gases o polvo.
- Controles periódicos.

Manejo

- Evaluación funcional pulmonar (espirometría).
- Evitar exposición a humo o contaminantes.
- Oxigenoterapia si hay hipoxemia.
- Educación sobre uso de inhaladores.

NEUMONÍA

Clinica

- Fiebre alta.
- Tos con expectoración purulenta.
- Disnea.
- Dolor torácico pleurítico.
- Estertores a la auscultación.

Manejo

- Radiografía de tórax.
- Oximetría de pulso.
- Exámenes de laboratorio (hemograma, PCR, cultivo de esputo).
- Evaluar gravedad (escala CURB-65).

Tratamiento

- Antibióticos según etiología (amoxicilina, macrólidos, cefalosporinas).
- Hidratación y reposo.
- Oxigenoterapia si es necesario.
- Analgésicos/antipiréticos.

Prevención

- Vacunación antigripal y antineumocócica.
- Lavado de manos frecuente.
- Evitar contacto con personas infectadas.
- Buena ventilación en espacios cerrados.

TUBERCULOSIS (TB)

Clinica

- Tos persistente (>2 semanas).
- Expectoración con sangre (hemoptisis).
- Fiebre vespertina.
- Sudoración nocturna.
- Pérdida de peso y apetito.

Tratamiento

- Fase intensiva: isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol (2 meses).
- Fase de continuación: isoniazida + rifampicina (4 meses).
- Supervisión directa del tratamiento (DOTS).

Manejo

- Baciloscopia y cultivo de esputo.
- Prueba de tuberculina (PPD).
- Radiografía de tórax.
- Aislamiento respiratorio en fase activa.

Prevención

- Vacuna BCG en la infancia.
- Detección temprana y tratamiento completo.
- Aislamiento en casos activos.
- Uso de mascarilla en ambientes de riesgo.