



NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE: Felipe Antonio Morales
Hernandez


NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO: Yuridia Aguilar Montero

CUATRIMESTRE: 6to

PARCIAL: 2do

MATERIA: Medico Quirúrgico II

TRABAJO: Cuadro Sinóptico



Cancer de Prostata



¿Qué es?

- Tumor maligno de estirpe epitelial constituido por células secretoras

Tres enfermedades que afectan la próstata

- Prostatitis: Infección bacteriana o viral
- Hiperplasia prostática benigna (HPB): Aumento de tamaño de la glándula central
- Cáncer de próstata: Tumor visceral en el hombre

factores de riesgo

- Ser mayor de 65 años
- Antecedentes heredo-familiares
- Dieta pobre en frutas y verduras
- Enfermedades de transmisión sexual
- Tabaquismo y alcohol

Síntomas

- Dificultad al orinar
- Goteo urinario en especial inmediatamente después de orinar
- Dolor al orinar, eyacular, de espalda, al evacuar o sensibilidad en los huesos
- Retención de orina
- Orinar varias veces por la noche
- Pérdida del control de vejiga



Hemorragia Intraparenquimatosa

¿Qué es?

- La hemorragia intraparenquimatosa es un sangrado que ocurre dentro del tejido cerebral (parénquima), afectando directamente a las células neuronales y la función cerebral. Puede estar causada por hipertensión arterial crónica, malformaciones vasculares, traumatismos o trastornos de la coagulación. Este tipo de hemorragia puede desencadenar síntomas graves como pérdida de conciencia, déficits neurológicos focales y aumento de la presión intracraneal.

Causas

- Hipertensión arterial:** Es la causa más común en adultos, ya que debilita las paredes de los vasos sanguíneos cerebrales.
- Malformaciones vasculares:** Como aneurismas o malformaciones arteriovenosas.
- Traumatismos craneoencefálicos:** Especialmente en personas jóvenes.
- Trastornos de la coagulación:** Ya sean congénitos o inducidos por medicamentos anticoagulantes.
- Amiloidosis cerebral:** Más frecuente en pacientes de edad avanzada.

Síntomas

- Dolor de cabeza intenso:** De inicio súbito.
- Déficits neurológicos:** Como debilidad o pérdida de sensibilidad en un lado del cuerpo.
- Alteraciones en el habla:** Dificultad para hablar o comprender.
- Confusión o pérdida de conciencia:** En casos severos.
- Convulsiones:** Especialmente si el sangrado afecta áreas motoras.

Diagnóstico

- Control médico:** Manejo de la hipertensión arterial y la coagulación.
- Intervención quirúrgica:** En casos de hematomas grandes que comprometan la vida del paciente.
- Cuidados intensivos:** Para monitorizar signos vitales y prevenir complicaciones.

