



**NOMBRE DE LA MATERIA:
ENFERMERIA DEL ADULTO
NOMBRE DEL TRABAJO:
PROBLEMAS INFECCIOSOS EN EL ADULTO
NOMBRE DEL DOCENTE:
MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA
NOMBRE DEL ALUMNO (A):
ZURISADAI SOLIS BONIFAZ
LIC.ENFERMERIA
6TO CUATRIMESTRE**

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

concepto

Las **enfermedades de transmisión sexual (ETS)**, también conocidas como **infecciones de transmisión sexual (ITS)**, son un grupo de infecciones que se transmiten principalmente a través del contacto sexual, ya sea vaginal, anal u oral. Estas enfermedades son causadas por microorganismos como bacterias, virus, hongos o parásitos.

- Es importante destacar que muchas ETS pueden ser asintomáticas, lo que significa que una persona puede estar infectada sin presentar síntomas, pero aún así puede transmitir la enfermedad. Por ello, la prevención (uso de preservativos, chequeos regulares) y la educación sexual son fundamentales para reducir su propagación.

clasificación

- **Gonorrrea:** Una infección bacteriana que puede ser tratada con antibióticos.
- **VIH/SIDA:** Virus de Inmunodeficiencia Humana que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
- **VPH:** Virus del Papiloma Humano, que puede causar verrugas y cáncer

- **Sífilis:** Infección bacteriana que puede ser tratada con penicilina.
- **Tricomoniasis:** Infección parasitaria que puede ser tratada con medicamentos antiparasitarios.
- Estas ETS pueden afectar tanto a hombres como a mujeres de cualquier edad y son tratables si se detectan a tiempo. Es importante realizar pruebas de ETC para prevenir y tratar estas infecciones

principales signos y síntomas

- Síntomas de la clamidia
Los signos y síntomas pueden incluir los siguientes:
- Micción dolorosa, que puede sentirse como ardor
 - Dolor en la zona baja del estómago o abdomen
 - Dolor en la región lumbar
 - Fiebre
 - Secreción vaginal

- Síntomas de la gonorrrea
- Secreción espesa, turbia o con sangre proveniente del pene o la vagina
- Dolor o sensación de ardor al orinar
- Sangrado menstrual abundante o sangrado entre períodos
- Dolor e hinchazón en los testículos
- Depositiones dolorosas

tratamiento.

Tratamiento farmacológico:
Seguimiento: Chlamydia: control a los 3 meses tras tratamiento para asegurar resolución de la clínica y descartar reinfección^{14,15}. En embarazadas o si no se ha realizado el tratamiento de primera elección o alternativa, se recomienda control a las 3 semanas tras finalizar el tratamiento^{12,14}. No repetir PCR antes de 4 semanas por riesgo de falso positivo

Tratamiento farmacológico:
Parejas sexuales: deben ser examinados y tratados todos los contactos sexuales, incluso asintomáticos, de los 60 días previos al inicio de los síntomas, o del último contacto, si hace más de 60 días o hasta 6 meses en el caso de parejas de varones con uretritis no gonocócica asintomáticos. Se debe aconsejar a los pacientes que se abstengan de mantener relaciones sexuales hasta que ellos y sus parejas completen el tratamiento y sean asintomáticos.