



Nombre del Alumno: **Cesar Iván Espinoza Morales.**

Nombre del tema: *Tipos de shock*


Parcial: **2**

Nombre de la Materia: ***prácticas profesionales***

Nombre del profesor: ***María del Carmen López silba.***

Nombre de la Licenciatura: ***Enfermería***

Cuatrimestre: **9no**



## MANIFESTACIONES

Provoca hipoxia tisular y fallo metabólico celular, bien por bajo flujo sanguíneo, o por una distribución irregular de éste.

## DEFINICION

El shock es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón y/o de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de órganos vitales.

## SISTEMA DE ATENCIÓN

Su correcto funcionamiento requiere de la integridad del sistema de alertamiento, su disfunción se le llama Síndrome Confusional Agudo.

### 2.3.1 ESTADO DE SHOCK



## PRESENTA:

Un conjunto de síntomas, signos y alteraciones analíticas y hemodinámicas que precisan una rápida identificación y tratamiento agresivo para reducir su elevada mortalidad.

## CONCIENCIA:

proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene un estado de alerta, con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno.

## SISTEMA DE ALERTA

La función normal de la corteza cerebral requiere un adecuado funcionamiento de estructuras subcorticales: sustancia reticular activadora ascendente.



## **Conclusión**

El shock es una condición clínica crítica que requiere intervención inmediata por parte del personal de enfermería para prevenir complicaciones graves e incluso la muerte.

Desde la perspectiva de enfermería, la detección temprana, la valoración continua de signos vitales, el monitoreo de la perfusión tisular y la implementación rápida de intervenciones terapéuticas son fundamentales para mejorar el pronóstico del paciente.

Además, la educación del paciente y la familia, el trabajo en equipo interdisciplinario y el uso de protocolos basados en evidencia son pilares esenciales en el manejo efectivo del shock.

Por tanto, el rol de enfermería es clave tanto en la prevención como en el tratamiento oportuno del shock, siendo una parte indispensable en el cuidado integral del paciente crítico.

## ***Bibliografía***

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/1032d1a5001eabc81ed4b5713aa25714-LC-LEN901%20PRACTICAS%20PROFESIONALES.pdf>