

TIPOS DE CEFALEAS

CEFALEAS PRIMARIAS

MIGRAÑA O JAQUECA

LOCALIZACIÓN
CUALIDAD

- Unilateral
- Tipo Pulsátil

DURACIÓN
INTENSIDAD

- 4-72 horas
- Moderada a severa

FACTORES QUE LA AGRAVAN
SÍNTOMAS

- movimiento y actividad física
- Sonofobia, fotofobia, náuseas, vómitos

Predominio

Sexo femenino, Comienzo [10-40 años]

CEFALEA TIPO TENSIÓN

Localización:
Cualidad:

- Bilateral
- Opresiva, envuelve el casco

Duración:
Intensidad:

- 30 min-7 días
- leve a moderada

Comienzo:
Síntomas:

- 20-50 años
- No

CEFALEA EN RACIMOS (DE HORTON)

Localización:
Cualidad:

- Unilateral, en región orbitaria supraorbitaria y/o temporal.
- Terribre

Duración:
Intensidad:

- 30-180 minutos, ataques con frecuencia de 1 cada 2 días a 5 ataques diarios.
- Excruciante

Predominio:
Signos acompañantes:

- Sexo masculino, Comienzo a los 20-30 años
- Inyección conjuntival, rinorrea, edema palpebral, sudoración facial, miosis y/o ptosis palpebral.

CEFALEAS SECUNDARIAS

- CEFALEA POR LESIONES TRAUMÁTICAS
- CEFALEA POSTPUNCIÓN LUMBAR
- CEFALEA POSTRAUMÁTICA
- CEFALEA DE CAUSA OCULAR
- CEFALEA POR SINUSITIS
- CEFALEA DE ORIGEN CERVICAL
- CEFALEA POR DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR
- CEFALEA DE LA ARTERIOESCLEROSIS DE LA TEMPORAL
- CEFALEA POR ACTIVIDAD SEXUAL

