

Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del alumno: Castellanos Pacheco Diego Antonio

Tema: Cefalea

Parcial: 3er. parcial

Nombre de la materia: Prácticas Profesionales

Nombre del profesor: María del Carmen López silba

Nombre de la licenciatura: Lic. En Enfermería

Cuatrimestre: Noveno cuatrimestre

• Cefaleas secundarias

Anomalías de las estructuras intra o extracraneanas

Cefalea por infección: La sinusitis, meningitis y encefalitis bacterianas o víricas y abscesos cerebrales cursan con cefalea, pero casi siempre se acompaña de fiebre.

Cefalea por consumo o abstinencia de sustancias: El consumo abusivo de sustancias como el alcohol o las drogas pueden provocar dolores de cabeza. Al igual la supresión de sustancias que se consumen de forma habitual puede causar cefalea.

Cefalea por traumatismo: Golpes en el cráneo o en las cervicales, pueden provocar cefaleas pasajeras o crónicas. También pueden ser provocadas por la entrada de fragmentos de cuerpos extraños dentro de la cabeza. Están acompañados de otros síntomas como pueden ser, mareos y fatiga.



Otros tipos de cefaleas secundarias



- Cefalea por aumento de la presión intracraneal idiopática o por un tumor cerebral



- Cefalea por hipotensión de líquido cefalorraquídeo cerebral



- Cefalea por patología vascular cerebral

- Cefalea por ansiedad o depresión

¿Qué es la cefalea?

Son trastornos dolorosos (caracterizados por dolor de cabeza recurrentes). Es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso que pueden ser causada por muchos otros trastornos, como el consumo excesivo de analgésicos.



Variedades clínicas de cefalias y sus características

• Cefaleas primarias

Indemnidad anatómica de las estructuras intra y extracraneanas que originan el dolor.




- **Cefalea tensional.** Dada por tensión muscular generalmente en la frente y la nuca. Se manifiesta con un dolor de cabeza leve y continuo con sensación de tensión y palpitación

- **Migraña:** El dolor está a un lado de la cabeza con un sentimiento de martillazos y ganas de vomitar. A menudo produce malestar ante la luz y el ruido. El 60% de los casos tiene antecedentes familiares. Es más frecuente en las mujeres.



Otros tipos de cefaleas primarias son:

- Cefalea hemicránea
- Cefalea neuralgiforme unilateral con inyección conjuntival y lagrimeo (SUCNT)
- Cefalea tusígena
- Cefalea por esfuerzo físico
- Cefalea asociada a la actividad sexual



- Cefalea por criostímulo
- Cefalea por hipóxia
- Neuralgia del trigémino



- Cefalea en racimos:

Dolor atroz dentro, detrás o alrededor de un ojo, pero que puede irradiarse a otras áreas de la cara, la cabeza y el cuello. Dolor en un solo lado. Inquietud. Lagrimeo. Enrojecimiento e hinchazón del ojo. Congestión nasal. Palidez en la cara. Párpado caído en el lado afectado

