Mi Universidad

Mapa conceptual

Alexa Paola Bermúdez Fernández

2do Parcial

Nutrición en obesidad en síndrome metabólico

Daniela Monserrath Méndez Guillén

Nutrición

6to cuatrimestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de junio del 2025

DIABETES MELLITUS Y SUS TIPOS.

TIPOS DE DIABETES MELLITUS

DM 1

Es de Origen autoinmune o idiopático
es de Déficit total de insulina
Necesita insulina de por vida

DM2

es Relacionada con obesidad y sedentarismo
con Resistencia a la insulina mas secreción insuficiente
pero Puede no requerir insulina inicialmente

OTROS TIPOS

en Defectos genéticos
en Enfermedades del páncreas exocrino
por Fármacos y químicos
Endocrinopatías

GESTACIONAL

Hiper glucemia detectada durante el embarazo
con Riesgo de desarrollar DM2 en el futuro

DIAGNÓSTICO

en Glucemia en ayuno ≥ 126 mg/dL
en AGA-110-125 mg/dL
en IT: Glucosa 2 h post carga oral 140-199 mg/dL
en HbA1c > 6.5% (criterio adicional)

PREVENCIÓN Y CONTROL

Detección a partir de los 45 años, cada 3 años
pero Más frecuente si hay factores de riesgo
Tratamiento
Dieta
Ejercicio
Medicación (metformina, insulina u otros antidiabéticos)

CLASIFICACIÓN Y CAMBIOS RECIENTES (ADA/DMS)

Basada en criterios etiológicos
Desaparecen los términos insulino dependiente I / No insulino dependiente
Nuevas categorías
AGA (glucosa en ayuno alterada)
IT (intolerancia a la glucosa)

DIABETES MELLITUS (DM)

Enfermedad genética y heterogénea.
con Alteración del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas.
deficit absoluto o relativo de insulina.
resistencia variable a la insulina.
Se caracteriza por Hiper glucemia en ayunas.
Complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas.

SINTOMAS PRINCIPALES

HIPERGLUCEMIA EN AYUNO
Polidipsia
Poliuria
y Pérdida de peso

ETIOPATOGENIA Y EVOLUCIÓN

componente genético y ambiental
factores inmunológicos en algunos tipos
Complicaciones microangiopáticas: retinopatía, nefropatía
Complicaciones macroangiopáticas: cardiopatía, arteriopatía periférica
y Neuropatía diabética

CONCEPTOS Y SIGNIFICADOS

DEFINICION

Enfermedad metabólica crónica..

caracterizada

hiperglucemia (glucosa alta en sangre).

causada

déficit en la producción y/o acción de insulina.

FACTORES DE RIESGO

SOBREPESO Y OBESIDAD

Vida sedentaria

Dietas hipercalóricas

y

Historia familiar

Hipertensión

y

Dislipidemia

SÍNDROME METABÓLICO

componente

Prediabetes mas otro factor de riesgo cardiovascular

como

Hipertensión

Dislipidemia

Obesidad abdominal

COMPLICACIONES A LARGO PLAZO

puede presentar

Retinopatía

Nefropatía

Neuropatía

Enfermedad cardiovascular

Daño a vasos sanguíneos

PREVENCIÓN

Promover

Dieta saludable

Actividad física

Peso corporal adecuado

Educación familiar sobre factores de riesgo

CONCEPTOS CLAVE

Glucemia

es

cantidad de glucosa en sangre.

Insulina

es la

hormona del páncreas que permite usar la glucosa como energía.

Hiperglucemia

es la

exceso de glucosa en sangre por fallos en insulina.

INCIDENCIAS Y PREVALENCIAS

EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

se basa en

criterios epidemiológicos.

Diagnóstico por

Glucosa en ayuno ≥ 126 mg/dL (7.0 mmol/L)

2 h post carga oral ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L)

HbA1c $\geq 6.5\%$ (uso aún limitado)

o

Prediabetes

Glucosa en ayuno: 100-125 mg/dL

Intolerancia a la glucosa: 140-199 mg/dL (post carga)

OCURRENCIA

INCIDENCIA

puede ser

Transición de no enfermo a enfermo.

Expresada en

Tasa por 1,000 personas/año

Riesgo acumulado (% en un tiempo definido)

y su

Prevalencia

Proporción de personas enfermas en un momento dado.

Aumenta por

Mayor duración de la enfermedad

Menor letalidad

EPIDEMIA GLOBAL

en

2000

150 millones de personas con diabetes

2011

366 millones

en

2030

Se espera 552 millones

con

Mayor crecimiento en

Países en desarrollo (170%)

México (208%)

por ende

Afecta especialmente a edades productivas (20-64 años)

VARIACIONES REGIONALES

Factores que influyen

edad

raza

estilo de vida

o

obesidad

y

genética

DATOS POR REGIÓN

en

México

IMSS (2006)

Hombres: 12.66%

Mujeres: 12.94%

en

EE.UU.

Riesgo de por vida

Hombres: 32.8%

Mujeres: 38.5%

Mayor en hispanos (hasta 52.5% en mujeres)

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS

Obesidad abdominal

es

Hipertensión arterial

Dislipidemia

RESISTENCIA A LA INSULINA

DEFINICION

Reducción en la capacidad de la insulina para ejercer sus efectos biológicos en tejidos

en

(músculo esquelético, hígado, tejido adiposo).

Resultado clínico

Insulina insuficiente frente a la glucosa → hiperglucemia

puede

evolucionar a diabetes tipo 2

MECANISMOS FISIOLÓGICOS

NORMAL

Insulina postprandial

hace

absorción de glucosa

mas

inhibición de gluconeogénesis hepática

Resistencia

Requiere más insulina para mismo efecto

causa

sobrecarga de células beta pancreáticas

Si no se compensa

aparece hiperglucemia

FACTORES ASOCIADOS

pueden ser

Genéticos (herencia poligénica)

y

Ambientales

como

Obesidad (adiposidad visceral)

Inactividad física

tambien

Dieta alta en grasas

Alteraciones metabólicas (dislipidemia, hipertensión)

SÍNDROME METABÓLICO

es

Conjunto de alteraciones relacionadas

como

Resistencia a la insulina

Obesidad abdominal

Hiperglucemia

y

Hipertrigliceridemia

HDL bajo

Hipertensión

y

Estado proinflamatorio y procoagulante

↑ Riesgo de diabetes tipo 2 y cardiopatía

REGULACIÓN GÉNICA Y DISFUNCIÓN

GLUT-4 ↓

en

Tejido adiposo de obesos y diabéticos tipo 2

GLUT-4 normal

en

Músculo de diabéticos y obesos (aunque hay resistencia)

GLUT-4 ↓

en

Músculo de ancianos, contribuye a resistencia relacionada con edad

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

Ejercicio físico

esto

↑ sensibilidad a insulina

↑ concentración de GLUT-4

Sobreexpresión de GLUT-4 (estudios en ratones)

la

↓ hiperglucemia

↑ tolerancia a glucosa

↑ sensibilidad a insulina

DETECCIÓN SISTEMÁTICA Y CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (ADA)

síntomas

Síntomas clásicos mas glucemia casual ≥ 200 mg/dL

Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL (tras 8 horas de ayuno)

Glucemia ≥ 200 mg/dL a las 2h post carga oral de glucosa (1.75 g/kg de peso, máx. 75g)

CLASIFICACIÓN (ADA 2005)

DIABETES TIPO 1

Origen autoinmune

hace

Destrucción de células beta del páncreas

factores

genéticos, ambientales, inmunológicos

Etapas clínicas

Inicio lento: glucemia en ayunas normal; postprandial elevada

Estado maniástico: hiperglucemia persistente y síntomas clásicos

y una

Cetoacidosis: emergencia médica (pH < 7.30, bicarbonato < 15)

DIABETES TIPO 2 (EN NIÑOS Y ADOLESCENTES)

pueden ser

Aparición promedio: 13.5 años

Asociada a resistencia fisiológica a la insulina

y

Antecedentes familiares frecuentes

Obesidad

también

Acantosis nigricans

OTROS TIPOS DE DIABETES

es

MODY (autosómica dominante)

Defectos genéticos en acción de insulina (resistencia tipo A, etc.)

Enfermedades del páncreas exocrino: pancreatitis

Endocrinopatías: Cushing, acromegalia

y

Fármacos: ácido nicotínico, L-asparaginasa, pesticidas

Infecciones: rubéola congénita, CMV

Síndromes genéticos: Down, Turner, Prader-Willi

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

Asegurar crecimiento y desarrollo adecuados

es

Evitar descompensación metabólica

y

Prevenir complicaciones agudas y crónicas

TRATAMIENTO DE LA PRE-DIABETES

TRATAMIENTO DE LA DIABETES

CRITERIOS GENERALES DE TRATAMIENTO

Basados en el algoritmo de la ADA

Enfatizan

Modificación del estilo de vida (MEV): alimentación y ejercicio

y

Educación del paciente

INICIO DEL TRATAMIENTO

CON OBESIDAD

iniciar

Metformina desde el diagnóstico, además de MEV

Pacientes indisciplinados: se recomienda farmacoterapia inmediata

también

Sin obesidad

Puede intentarse MEV como único tratamiento al inicio si hay buena adherencia

FÁRMACOS UTILIZADOS

pueden ser

Metformina

Primera elección en pacientes obesos

y

Mejora la sensibilidad a la insulina

también

Insulina inhalada

Aprobada por FDA

pero

No recomendada aún en guías ADA

también

Insulina detemir

pero

Alta afinidad por albúmina (98-99%)

Menor variabilidad glucémica que NPH o glargina

pero

menos Riesgo de hipoglucemia nocturna

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

como

Control glucémico adecuado

Mantenimiento de HbA1c en rango objetivo

Prevención de complicaciones (agudas y crónicas)

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ASISTENCIA NUTRICIONAL.

OBJETIVO PRINCIPAL

son

Mantener niveles de glucosa en sangre dentro de los límites recomendados

Promover un estilo de vida saludable (alimentación y actividad física)

ELEMENTOS CLAVE DEL PLAN NUTRICIONAL

QUÉ COMER

Qué comer

Cuándo comer

Equilibrio con:

Medicamentos
Insulina

Actividad física

GRUPOS DE ALIMENTOS RECOMENDADOS

pueden ser

Verduras sin almidón:
brócoli, zanahorias, hojas verdes

y

Verduras feculentas: papas, maíz, chícharos

como

Frutas: fresas, manzanas, naranjas, uvas

Granos: arroz, avena, pan integral, cereales

también

Proteínas:
• Carnes magras (pollo sin piel, pavo, pescado)
• Huevos, frijoles, tofu, leguminosas

Lácteos bajos en grasa:
leche, yogur, queso

ALIMENTOS Y BEBIDAS A LIMITAR

son

Fritos y altos en grasas saturadas/trans

Dulces (pasteles, helados)

Bebidas azucaradas (refrescos, jugos)

Alimentos con alto contenido de sodio

Alcohol (máx. 1 trago/día mujer, 2 hombre)

ALCOHOL Y DIABETES

Puede causar hipoglucemia si se toma sin haber comido

y

Requiere precaución y control

BENEFICIOS DE LA NUTRICIÓN ADECUADA

Control de

glucosa

presión arterial

colesterol

Ayuda a

Perder o mantener peso

Prevenir complicaciones

Mejorar energía y bienestar

APOYO MULTIDISCIPLINARIO

son

Equipo de atención médica

Familia y amigos

Educadores en diabetes

COMPLICACIONES AGUDAS.

HIPOGLUCEMIA

en

Glucosa venosa < 60 mg/dl

Glucosa capilar < 50 mg/dl

CLASIFICACIÓN CLÍNICA:

LEVE

síntomas

autonómicos (temblores, sudoración, hambre, visión borrosa), sin deterioro funcional

Moderada

síntomas

confusión, alteración motora, el paciente aún puede autotratarse.

Grave

síntomas

pérdida de conciencia, convulsiones, requiere asistencia de terceros.

HIPOGLUCEMIA NOCTURNA

Ocurre entre 1:00 y 3:00 a.m.

síntomas

pesadillas, sudoración, cefalea matutina

diagnostico

glucemias capilares nocturnas

CONSECUENCIAS GRAVES

son

Efecto Somogyi (hiperglucemia rebote)

Eventos cardiovasculares y cerebrovasculares

Daño cerebral irreversible (encefalopatía hipoglucémica)

Hemorragias retinianas

HIPERGLUCEMIA

causada

por déficit absoluto o relativo de insulina

Puede derivar en

Cetoacidosis diabética (CAD)

Síndrome hiperglucémico hiperosmolar (SHH)

Cuadros mixtos (CAD + SHH)

CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)

Criterios diagnósticos

Glucemia > 300 mg/dl

Cetonemia > 3 mmol/l

pH < 7.3 o bicarbonato < 15 mEq/l

Incidencia

2-5% de pacientes con DM1 al año

Factores precipitantes:

Infecciones

Omisión o error en la dosis de insulina

TRATAMIENTO DE CAD

Hidratación

- Suero salino 1 L en 1 h inicial + 1 L siguiente hora
- Total 6-10 L en 24 h
- Suero glucosado 5% cuando glucosa < 250 mg/dl

Insulina

- Regular, IV continua (0.1 U/kg/h o bolo 10 U/h)
- Reducir dosis cuando mejore el estado metabólico

Potasio

- eposición desde el inicio: 10-30 mEq/h
- Meta: mantener K⁺ > 3.5 mEq/l

Dieta

- Reanudar alimentación al corregir acidosis y sin náuseas
- Alimentos fáciles de digerir y poco cetogénicos

COMPLICACIONES A LARGO PLAZO

FACTORES DE RIESGO

son

Hiperglucemia sostenida

Hipertensión arterial

Dislipidemia

Tabaquismo

y

Tiempo de evolución de la enfermedad

TIPOS DE COMPLICACIONES

MACROVASCULARES

Afectan grandes vasos sanguíneos (arteriosclerosis)

Enfermedad coronaria (IAM, angina)

Enfermedad cerebrovascular (ACV)

Enfermedad vascular periférica

Principal causa de muerte en diabéticos

MICROVASCULARES

estos

Afectan vasos pequeños

como

retinopatía

Segunda causa de ceguera en el mundo occidental

tiene

Prevalencia: casi todos los DM1 a los 20 años y >60% de DM2uropatía

también la

nefropatía,

es

Principal causa de insuficiencia renal crónica

el

20-30% de diabéticos la desarrolla

Síndrome clínico: proteinuria > 300 mg/24h, HTA e IR progresiva

PIE DIABÉTICO

es

Resultado de neuropatía periférica más macroangiopatía

Causa frecuente de amputaciones no traumáticas

consecuencias

úlceras, infecciones, gangrena

IMPACTO CLÍNICO

Las complicaciones macrovasculares

tienen

mayor mortalidad

y las

Las microvasculares

tienen

menor calidad de vida y alto costo sanitario

HIPOGLUCEMIAS DE ORIGEN NO DIABETICO.