Mi Universidad

Mapa conceptual

Alexa Paola Bermúdez Fernández

2do Parcial

Nutrición en enfermedades cardiovasculares

Daniela Monserrath Méndez Guillén

Nutrición

6to cuatrimestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de junio del 2025

HIPERTENSION ARTERIAL

INCIDENCIA Y PREVALENCIA

CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN ADULTOS

CLASIFICACIÓN

LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y NUTRICIÓN

MANIFESTACIONES DE LESIONES CAUSADAS POR HTA

FACTORES DE RIESGO DE LA HTA

COMPLICACIONES DE LA HTA

CARDIACAS

Aumento del tamaño del corazón

signos electrocardiograficos de isquemia

o

de sobrecarga del ventriculo izquierdo

hipertrofia del ventriculo izquierdo

tambien

infarto de miocardio

insuficiencia cardiaca

OJOS

exudados

hemorragias retinianas

y

edema de pupila

RENAL

alteración

de la función renal

SISTEMA NERVIOSO

presenta

accidente cerebrovascular

PREVENCIÓN PRIMARIA

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA EL ADULTO EN LA HTA

EL SODIO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y LA HTA

FUENTES DE SODIO EN LA DIETA

80%: alimentos procesados y de restaurantes

10%: sal añadida en casa (cocinar o en la mesa)

10%: sodio naturalmente presente en alimentos

PROBLEMAS ASOCIADOS AL ALTO CONSUMO DE SODIO

Aumento del riesgo de hipertensión arterial (HTA)

Elevación de la mortalidad cardiovascular

Dificultad para mantener una alimentación saludable

Alta presencia de sodio en alimentos comunes

Falta de conciencia del consumidor

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL SODIO

Fijar niveles obligatorios de sodio

para

todos los alimentos en EE.UU.

tienen obligatoria

Reducción voluntaria por parte de fabricantes

Apoyo institucional y social

tambien

Educación al consumidor

Mejorar vigilancia y datos

como

Ingesta real de sodio

Preferencias de sabor salado

Contenido en sodio de productos

INDUSTRIA ALIMENTARIA

la mayoría

de productos del supermercado y restaurantes contienen altas cantidades de sal

existen

grandes diferencias en sodio entre marcas

que

Demuestra que reducir sodio sin sacrificar sabor es posible

TRATAMIENTO DE LA HTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

TIPOS DE HIPERTENSIÓN EN LA INFANCIA

HIPERTENSIÓN PRIMARIA

Más frecuente en adolescentes

Asociada con

Obesidad

Antecedentes familiares

HIPERTENSIÓN SECUNDARIA

mas

COMÚN EN NIÑOS PREADOLESCENTES

Principal causa

enfermedad renal

Otros factores

Retraso del crecimiento intrauterino

puede tener

riesgo de HTA en la infancia

DIAGNÓSTICO

Basado en percentiles

HTA: PAs o PAD > percentil 95 (según edad, sexo y estatura)

y

Prehipertensión: PAs o PAD > percentil 90

TRATAMIENTO INICIAL: MODIFICACIONES DEL ESTILO DE VIDA

Actividad física regular

Evitar aumento excesivo de peso

Dieta tipo DASH

alta

Alta en frutas, verduras y lácteos bajos en grasa

y

Baja en sodio y alimentos procesados

Reducción de peso (clave en casos relacionados con obesidad)

DESAFÍOS EN EL TRATAMIENTO

puede ser

Difícil lograr y mantener la pérdida de peso en esta etapa

tiene

Adherencia limitada a dietas saludables

puede tener

Necesidad de estrategias innovadoras

a

Adaptadas a las circunstancias de niños y adolescentes

Intervenciones conductuales y educativas

PATRONES DIETETICOS DESTACADOS EN LA HTA

DIETAS EFECTIVAS PARA REDUCIR LA PRESIÓN ARTERIAL

DIETA VEGETARIANA

Reducción de PAs: 5-6 mmHg

es Menor consumo de grasa saturada

tienen alta en potasio, fibra y antioxidantes

DIETA DASH

rica en

FRUTAS, VERDURAS, PRODUCTOS LÁCTEOS BAJOS EN GRASA, CARNES MAGRAS, NUTECES

bajo contenido en sodio y grasas saturadas

Reducción comprobada de la PAs y PAD

no recomendada para pacientes con enfermedad renal terminal (por alto contenido en potasio y fósforo)

REDUCCIÓN DE PESO

IMC elevado = mayor riesgo de HTA

con Obesidad

Hiperactividad SNS y SRA, inflamación vascular

con Pérdida de peso mejora significativamente la presión arterial, incluso sin alcanzar peso ideal

Sensibilidad a la sal es mas común

Personas mayores

Raza negra

Obesos

Diabéticos o con enfermedad renal

CALCIO

es un

Efecto protector más claro con lácteos que con suplementos

Baja ingesta

puede aumentar hormona paratiroidea y resistencia vascular

en Lácteos fermentados

los péptidos tipo ECA

ayudan a la reducción de presión arterial

MAGNESIO

función

vasodilatadora

alimentos

verduras de hoja verde, cereales integrales, frutos secos

es mejor

obtenerlo de fuentes alimentarias, no suplementos

POTASIO

se debe

Suplementos: 1.900-4.700 mg/día

para tener

Reducción de 2-6 mmHg

al día en hombres a 1 y en mujeres a la mitad

reducir el PAs 2-4 mmHg

ACTIVIDAD FÍSICA

para

Personas inactivas → 30-50% más riesgo de HTA

recomendaciones

30-45 minutos de ejercicio moderado casi todos los días

Grupos con mayor sedentarismo

son

Mujeres hispanas (40%)

Mujeres negras (34%)

Hombres caucásicos (18%)

ALCOHOL

en

3 bebidas/día

aumento de 3 mmHg en PAs

Recomendación

Hombres: ≤2 bebidas/día

Mujeres: ≤1 bebida/día