

ACTIVIDAD 2, MAPA CONCEPTUAL



“UNIDAD II CUIDADOS PARA EL APOYO NUTRICIONAL”


ASIGNATURA: PRACTICAS DE NUTRICION CLINICA II

PROFESORA: Daniela Monserrat Méndez Guillen

ALUMNA: JAZMIN BERNABE GALICIA

9no. CUATRIMESTRE

14/06/25



UNIDAD II

```
graph TD; A[UNIDAD II] --> B[nutrición enteral  
administración por vía  
digestiva de alimentos  
especiales]; A --> C[Los alimentos deben  
presentarse en forma  
líquida, sin grumos, que  
permita su paso a  
través de una sonda  
delgada]; A --> D[alimentos convencionales  
alimentos que han sufrido  
pequeñas modificaciones  
tecnológicas, que, son aptos  
para ese tipo de preparados]; C --> E[La industria farmacéutica  
produce alimentos especiales  
para ne, en polvo o en estado  
líquido]; C --> F[con una proporción de  
glúcidos, proteínas y lípidos de  
acuerdo con la alimentación  
equilibrada]; C --> G[es preciso calcular las  
recomendaciones  
energéticas de cada paciente];
```

nutrición enteral
administración por vía
digestiva de alimentos
especiales

Los alimentos deben
presentarse en forma
líquida, sin grumos, que
permita su paso a
través de una sonda
delgada

alimentos convencionales
alimentos que han sufrido
pequeñas modificaciones
tecnológicas, que, son aptos
para ese tipo de preparados

La industria farmacéutica
produce alimentos especiales
para ne, en polvo o en estado
líquido

con una proporción de
glúcidos, proteínas y lípidos de
acuerdo con la alimentación
equilibrada

es preciso calcular las
recomendaciones
energéticas de cada paciente

UNIDAD II

```
graph TD; A[UNIDAD II] --> B[La alimentación enteral está indicada en pacientes que no pueden ingerir una alimentación convencional oral]; A --> C[En casos de un trastorno grave de la consciencia, se valorará el riesgo/beneficio de la indicación]; A --> D[los proceso orofaringologeos dificultan o imposibilitan el acceso del alimento o su deglución]; C --> E[Anorexias graves De origen orgánico o psíquico]; C --> F[Postoperatorios de cirugía gástrica o esofágica. La alimentación es a través de una sonda de yeyunostomía.]; C --> G[Algunos pacientes pueden ingerir la ne por boca, pero la mayoría debe hacerlo a través de una sonda de alimentación];
```

La alimentación enteral está indicada en pacientes que no pueden ingerir una alimentación convencional oral

En casos de un trastorno grave de la consciencia, se valorará el riesgo/beneficio de la indicación

los proceso orofaringologeos dificultan o imposibilitan el acceso del alimento o su deglución

Anorexias graves
De origen orgánico o psíquico

Postoperatorios de cirugía gástrica o esofágica. La alimentación es a través de una sonda de yeyunostomía.

Algunos pacientes pueden ingerir la ne por boca, pero la mayoría debe hacerlo a través de una sonda de alimentación

UNIDAD II

```
graph TD; A[UNIDAD II] --> B[Sonda nasogastrica entrada de uno de los orificios nasales, se hace progresar la sonda hasta la cavidad gástrica]; A --> C[Sonda naso-gastro-duodenal y naso-gastro-yeyunal el extremo distal queda situado en el interior del duodeno o del yeyuno]; A --> D[Sonda de gastrostomía se introduce en la cavidad gástrica a través de una incisión quirúrgica de la pared abdominal.]; C --> E[Sonda de yeyunostomía método utilizado para nutrir al enfermo tras intervenciones quirúrgicas.]; C --> F[Faringostomía, esofagostomía Método poco utilizados, la sonda se introduce, en la correspondiente incisión y disección cervical o supraclavícula]; C --> G[Existen distintos tipos de sondas, según el material o composición química];
```

Sonda nasogastrica entrada de uno de los orificios nasales, se hace progresar la sonda hasta la cavidad gástrica

Sonda naso-gastro-duodenal y naso-gastro-yeyunal el extremo distal queda situado en el interior del duodeno o del yeyuno

Sonda de gastrostomía se introduce en la cavidad gástrica a través de una incisión quirúrgica de la pared abdominal.

Sonda de yeyunostomía método utilizado para nutrir al enfermo tras intervenciones quirúrgicas.

Faringostomía, esofagostomía Método poco utilizados, la sonda se introduce, en la correspondiente incisión y disección cervical o supraclavícula

Existen distintos tipos de sondas, según el material o composición química

UNIDAD II

```
graph TD; A[UNIDAD II] --- B[Sondas de gastrostomía]; A --- C[Sondas doble luz]; A --- D[Colocación de la sonda de alimentación]; A --- E[Administración de líquido nutritivo]; A --- F[Duración de uso de sondas modernas]; A --- G[Complicaciones de la alimentación por sonda];
```

Sondas de gastrostomía

Se colocan durante el acto quirúrgico para aspiración postoperatoria del contenido de la cavidad gástrica

Sondas doble luz

uno de sus extremos internos colocado en el interior del estómago y el otro en el duodeno o yeyuno para alimentación

colocada la sonda de alimentación se calcula la energía, las proteínas, el agua, el sodio y el resto de las sustancias nutritivas que precisa el paciente

es necesario administrar el líquido nutritivo a débito continuo, para mejorar la tolerancia

Las sondas modernas, pueden tolerarse durante dos o más meses.

Complicaciones de la alimentación por sonda

- 1) mecánicas;
- 2) digestivas;
- 3) metabólicas,
- 4) infecciosas

BIBLIOGRAFÍA:

Universidad del Sureste. (2025). Antología de Practicas de nutrición clínica II [Archivo PDF].