





**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**LICENCIATURA EN ENFERMERIA**

**alumna :Angela yahaira garcia reyes**

**Tapachula , chiapas a 25 de julio del  
2025**



# FÁRMACOS ANTITUSÍGENOS Y MUCOLÍTICOS

antitusígenos: Son medicamentos que suprimen o calman la tos seca.

Se usan cuando la tos no produce flema y es molesta o persistente

Mucolíticos: Son medicamentos que disminuyen la viscosidad del moco, haciéndolo más líquido.

Se usan en tos productiva (con flemas espesas), para facilitar la expulsión del moco.

## función y como actúa

Suprimen la tos seca (no productiva)

- A nivel central (cerebro: reflejo de la tos)
- A nivel periférico (vías respiratorias)
- Uso: Tos irritativa, sin flema



ANTITUSÍGENOS

## EJEMPLO

- Codeína → Opiode, acción central, sedante
- Dextrometorfano → No opioide, acción central, menos efectos adversos
- Levodropropizina → Acción periférica, menos sedación

## EJEMPLO

- Acetilcisteína → Rompe enlaces del moco
- Ambroxol → Estimula secreción expectorante
- Bromhexina → Fluidifica el moco, precursor de ambroxol

## función y como actúa

Función: Disminuyen la viscosidad del moco (flema)

Facilitan: La expectoración en tos productiva

Uso: Bronquitis, EPOC, tos con flema espesa



MUCOLÍTICOS