

**Jesús Alonso Cruz  
Mérida**

**Universidad del  
sureste**

**26 de julio del 2025**

**infecciones de  
transmisión sexual**

# INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

ITS



## ¿QUE SON LAS ITS?

Son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Si no son tratadas, pueden convertirse en una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

### VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

+Es la ITS más común.  
+Puede causar verrugas genitales y está relacionado con varios tipos de cáncer, como el de cuello uterino.



**CUIDAR TU CUERPO ES UNA  
INVERSIÓN EN TU BIENESTAR.**

### VPH DE BAJO RIESGO

Pueden causar verrugas genitales o verrugas en otras áreas, como la boca o la garganta, pero rara vez causan cáncer.

### VPH DE ALTO RIESGO

Pueden causar varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer de cuello uterino, ano, vagina, vulva, pene y garganta.

## CLAMIDIA

### ¿QUE ES?

**Es una infección causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. A menudo no presenta síntomas, pero puede causar daño permanente en el aparato reproductor si no se trata. Es curable con antibióticos**



### FORMAS DE TRANSMISION

La clamidia puede ser transmitida de dos maneras: por la vía sexual (anal, vaginal u oral) o de madre a hijo, durante el paso del bebé por el canal vaginal a la hora del parto.

### SINTOMAS

**MUJER**  
Flujo vaginal.  
Sangrado vaginal.  
Dolor abdominal.  
Dolor durante el sexo.  
Ardor o dolor al orinar.

**HOMBRES**  
Ardor o dolor al orinar.  
Salida de corrimiento purulento por la uretra.  
Hinchazón del escroto.  
Dolor en los testículos.  
Proctitis (inflamación del ano que ocurre en hombres homosexuales pasivos).

## HERPES GENITAL



Causada por el virus del herpes simple. Puede causar llagas en el área genital o rectal, nalgas y muslos. Puede contagiarse al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que lo tenga. El virus puede contagiarse aún cuando las llagas no están presentes. Las madres pueden infectar a sus bebés durante el parto.

### SINTOMAS

- Dolor o picazón alrededor de los genitales.
- Pequeños bultos o ampollas alrededor de los genitales, el ano o la boca.
- Úlceras dolorosas que se forman cuando las ampollas se rompen y exudan o sangran.
- Costras que se forman a medida que las úlceras se curan.
- Micción dolorosa.
- Secreción de la uretra, el conducto que expulsa la orina del cuerpo.
- Secreción de la vagina

### COMPLICACIONES

-Infección de recién nacidos. Durante el parto, los bebés pueden infectarse con el virus del herpes simple.

-Enfermedad inflamatoria interna. La infección por el virus del herpes simple puede causar hinchazón e inflamación dentro de los órganos que intervienen en las relaciones sexuales y la micción.

## GONORREA

Causada por una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae, también conocida como gonococo.

La gonorrea es la principal causa de la uretritis, es decir, inflamación de la uretra, el canal que drena la orina desde la vejiga. El gonococo puede crecer fácilmente en áreas cálidas y húmedas de nuestro tracto reproductivo, incluido el cuello uterino, el útero, las trompas de Falopio y la uretra.

### SINTOMAS

- Secreción purulenta (de aspecto lechoso o amarillento) por la uretra.
- Disuria (sensación de ardor o dolor al orinar).
- Urgencia de orinar.
- Inflamación en la punta del pene, en el orificio de la uretra.

## SIDA

Significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa final de la infección por VIH. Ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado por el virus.

### SINTOMAS

- Fiebre
- Escalofríos
- Sarpullido
- Sudoración nocturna (transpirar mucho durante la noche)
- Dolor muscular
- Dolor de garganta
- Fatiga
- Ganglios linfáticos inflamados
- Llagas en la boca