



INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)

Cristina Concepción Avila Gordillo

Lic. Yaritza

Enfermería del adulto

UNIVERSIIDAD DEL SURESTE

Licenciatura enfermería

Tapachula, Chiapas

26 DE JULIO DEL 2025

INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL ITS

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)



+ES LA ITS MÁS COMÚN. +PUEDE CAUSAR VERRUGAS GENITALES Y ESTÁ RELACIONADO CON VARIOS TIPOS DE CÁNCER, COMO EL DE CUELLO UTERINO

-VPH DE BAJO RIESGO- PUEDEN CAUSAR VERRUGAS GENITALES O VERRUGAS EN OTRAS ÁREAS, COMO LA BOCA O LA GARGANTA, PERO RARA VEZ CAUSAN CÁNCER.

-VPH DE ALTO RIESGO PUEDEN CAUSAR VARIOS TIPOS DE CÁNCER, INCLUYENDO CÁNCER DE CUELLO UTERINO, ANO, VAGINA, VULVA, PENE Y GARGANTA.


CLAMIDIA

MUJER: FLUJO VAGINAL. SANGRADO VAGINAL. DOLOR ABDOMINAL. DOLOR DURANTE EL SEXO. ARDOR O DOLOR AL ORINAR

HOMBRE: ARDOR O DOLOR AL ORINAR. SALIDA DE CORRIMIENTO PURULENTO POR LA URETRA. HINCHAZÓN DEL ESCROTO. DOLOR EN LOS TESTÍCULOS. PROCTITIS (INFLAMACIÓN DEL ANO QUE OCURRE EN HOMBRES HOMOSEXUALES PASIVOS).

LINFOGRANULOMA VENÉREO: LA INFECCIÓN INICIAL SE CARACTERIZA POR UN PEQUEÑO NÓDULO QUE SE ROMPE Y FORMA UNA ÚLCERA GENITAL. DOS A SEIS SEMANAS MÁS TARDE, LA INFECCIÓN SE EXTIENDE HACIA LOS NÓDULOS LINFÁTICOS REGIONALES, ES DECIR, HACIA LOS GANGLIOS DE LA INGLE.

ES UNA INFECCIÓN CAUSADA POR LA BACTERIA CHLAMYDIA TRACHOMATIS. A MENUDO NO PRESENTA SÍNTOMAS, PERO PUEDE CAUSAR DAÑO PERMANENTE EN EL APARATO REPRODUCTOR SI NO SE TRATA. ES CURABLE CON ANTIBIÓTICOS.



FORMAS DE TRANSMISION

POR LA VÍA SEXUAL (ANAL, VAGINAL U ORAL) O DE MADRE A HIJO

PREVENCION

1.TEN RELACIONES SEXUALES SEGURAS O EVITA TENER RELACIONES SEXUALES. 2.USA UN PRESERVATIVO DE LÁTEX. 3.CONSUMO DE ALCOHOL Y EVITA LAS DROGAS ILÍCITAS. 4.EVITA LAS DUCHAS VAGINALES.

VACUNA

-VACUNA DEL VPH
-VACUNA DE HEPATITIS A Y B

HERPES GENITAL


CAUSADA POR EL VIRUS DEL HERPES SIMPLE. PUEDE CAUSAR LLAGAS EN EL ÁREA GENITAL O RECTAL, NALGAS Y MUSLOS. PUEDE CONTAGIARSE AL TENER RELACIONES SEXUALES VAGINALES, ANALES U ORALES CON ALGUIEN QUE LO TENGA. EL VIRUS PUEDE CONTAGIARSE AÚN CUANDO LAS LLAGAS NO ESTÁN PRESENTES. LAS MADRES PUEDEN INFECTAR A SUS BEBÉS DURANTE EL PARTO

DOLOR O PICAZÓN ALREDEDOR DE LOS GENITALES. PEQUEÑOS BULTOS O AMPOLLAS ALREDEDOR DE LOS GENITALES, EL ANO O LA BOCA. ÚLCERAS DOLOROSAS QUE SE FORMAN CUANDO LAS AMPOLLAS SE ROMPEN Y EXUDAN O SANGRAN. COSTRAS QUE SE FORMAN A MEDIDA QUE LAS ÚLCERAS SE CURAN. MICCIÓN DOLOROSA. SECRECIÓN DE LA URETRA, EL CONDUCTO QUE EXPULSA LA ORINA DEL CUERPO. SECRECIÓN DE LA VAGINA

GONORREA

SINTOMAS PURULENTO (DE ASPECTO LECHOSO O AMARILLENTO) POR LA URETRA. DISURIA (SENSACIÓN DE ARDOR O DOLOR AL ORINAR). URGENCIA DE ORINAR. INFLAMACIÓN EN LA PUNTA DEL PENE, EN EL ORIFICIO DE LA URETRA. DIAGNOSTICO ES UNA PRUEBA DE ORINA LLAMADA NAAT (PRUEBA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS), QUE DETECTA DIRECTAMENTE EL ADN DE LA BACTERIA

- CEFTRIAXONA
- AZITROMICINA



¿QUÉ ES EL VIH? ¿QUÉ ES EL SIDA?

SIGNIFICA VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. DAÑA SU SISTEMA INMUNITARIO AL DESTRUIR UN TIPO DE GLÓBULO BLANCO QUE AYUDA A SU CUERPO A COMBATIR LAS INFECCIONES.

SIGNIFICA SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA. ES LA ETAPA FINAL DE LA INFECCIÓN POR VIH. OCURRE CUANDO EL SISTEMA INMUNITARIO DEL CUERPO ESTÁ MUY DAÑADO POR EL VIRUS.



SINTOMAS: FIEBRE ESCALOFRÍOS SARPULLIDO SUDORACIÓN NOCTURNA (TRANSPIRAR MUCHO DURANTE LA NOCHE) DOLOR MUSCULAR DOLOR DE GARGANTA FATIGA GANGLIOS LINFÁTICOS INFLAMADOS LLAGAS EN LA BOCA

SIFILIS ES UNA INFECCIÓN CAUSADA POR BACTERIAS. LA MAYORÍA DE LAS VECES, SE TRANSMITE POR CONTACTO SEXUAL. LA ENFERMEDAD COMIENZA A HACERSE PRESENTE CON UNA LLAGA EN LOS GENITALES, EL RECTO O LA BOCA, QUE NO SUELE GENERAR DOLOR.-ES UNA BACTERIA LLAMADA TREPONEMA PALLIDUM.

HEPATITIS ES LA INFLAMACIÓN DEL HÍGADO. INFLAMACIÓN ES LA HINCHAZÓN DE ÓRGANOS QUE OCURREN CUANDO SE LESIONAN O INFECTAN, Y PUEDE DAÑAR SU HÍGADO. LA HINCHAZÓN Y DAÑO PUEDE AFECTAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE ÓRGANO

HEPATITIS A SE CARACTERIZA POR SER AUTO-LIMITADA, LO QUE SIGNIFICA QUE EL CUERPO PUEDE ELIMINAR EL VIRUS SIN NECESIDAD DE TRATAMIENTO MÉDICO, SIMPLEMENTE CON DESCANSO Y ATENCIÓN A LA NUTRICIÓN. LOS SÍNTOMAS PUEDEN INCLUIR FATIGA, Náuseas y fiebre, y no suele progresar a una enfermedad crónica. Su principal modo de transmisión es ingiriendo alimentos o agua contaminada, aunque en raras ocasiones, también puede transmitirse durante relaciones sexuales.

HEPATITIS B REPRESENTA UN RIESGO MAYOR DE CONVERTIRSE EN UNA CONDICIÓN CRÓNICA QUE PUEDE RESULTAR EN COMPLICACIONES SERIAS COMO CIRROSIS O CÁNCER DE HÍGADO A LARGO PLAZO. SU TRANSMISIÓN OCURRE PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES INFECTADOS, PUDIENDO TAMBIÉN TRANSMITIRSE DE MADRE A HIJO DURANTE EL PARTO.



Bibliografia

diapositiva corrispondente

Bibliografia