UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Lic. en enfermería

MATERIA
Enfermería del adulto del adulto

TEMA
Gastroenteritis infecciosa GEPI

ALUMNA
Santizo Gómez paulina Inés

DOCENTE
Yaritza Marín Ruiz

FECHA
26/07/2025

Infografía de

GASTROENTERITIS INFECCIOSA "GEPI"

es una inflamación y/o disfunción del intestino producida por un germen o sus toxinas, que da lugar a una alteración de su capacidad para regular la absorción y secreción de sales y agua, produciendo diarrea.

Se contrae principalmente a través del contacto con alimentos o agua contaminados, o por contacto cercano con personas infectadas

causas

- Virus:

Los virus más comunes son el norovirus (especialmente en niños en edad escolar y brotes) y el rotavirus.



- Bacterias:

Campylobacter jejuni, E. coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus y Yersinia.

- Parásitos:

como Cryptosporidium y Giardia intestinalis

factores de riesgo

- el consumo de alimentos o agua contaminados,
- el contacto con personas infectadas,
- la mala higiene personal,
- el lavado de manos inadecuado.
- personas con sistemas inmunitarios debilitados ,niños, adulto mayor

sintomas

- Diarrea
- dolor o calambres en el abdomen (vientre)
- Náuseas
- Vómitos
- En ocasiones, fiebre
- escalofríos
- deshidratación
- perdida del apetito
- heces con sangré
-

modos de transmisión

contacto directo ejemplo con personas contagiadas inhalar pequeñas partículas de vómito o heces,

Contacto con alimentos y agua contaminados: Manipula alimentos sin lavarse las manos adecuadamente, o si el agua está contaminada.

superficies contaminadas, como mesas, juguetes, o inodoros,

contacto con fluidos corporales

tratamiento

- beber abundante agua
- descansar
- medicamentos para la infección (doxiciclina, azitromicina, ampicilina).diarrea loperamida (Imodium) o el subsalicilato de bismuto (Pepto-Bismol)

cuidados de enfermeria

- Monitorización de SV para detectar fiebre, taquicardia o taquipnea, que pueden indicar deshidratación o infección.
- Evaluar la turgencia de la piel, el estado de las mucosas, la presencia de lágrimas, el llenado capilar y la diuresis para determinar el grado de deshidratación.
- Observar la frecuencia, cantidad, consistencia, color y presencia de moco o sangre en las heces.
- Intervenciones como rehidratación, control de síntomas, prevención de infecciones, educación.
-

INFOGRAFIA

diapositivas de exposición vistas en clase