



**Sem benjamin vazquez ibarias**

**Psiquiatria**

**Dr. Cid Hernandez Inti Omar**

**1 parcial**

**5 semestre**

**Licenciatura en medicina humana**

# TRANSTORNOS DEL NEURODESARROLLO

1

## TRANSTORNOS DEL NEURODESARROLLO

Son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo

### DISCAPACIDAD INTELECTUAL

1. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas
2. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de estándares de crecimiento
3. Inicio de las deficiencias adaptativas

Factores de riesgo

1. Genéticos
2. Fisiológicos

### TRANSTORNO DEL LENGUAJE

1. Vocabulario reducido
2. Capacidades del lenguaje por debajo de lo normal
3. Los síntomas se producen en las primeras fases del crecimiento
4. Los síntomas no son atribuible a un deterioro auditivo

Características que apoyan el diagnóstico

- Antecedentes familiares
- Timidos al hablar
- Solo comunicación con su familia

Diagnostico diferencial

- Deficiencia de audicion
- Transtornos neurologicos

### TARTAMUDEO

1. Alteracion en la fluidez
2. Causa ansiedad al hablar
3. No se puede atribuir a un transtorno motor

Diagnostico diferencial

- Disfluencias anormales del habla
- Transtorno de tourette

2

## AUTISMO

Características diagnósticas

1. Deficiencias persistentes en la comunicacion social
2. Síntomas presentes en la primera infancia
3. Deficiencias de la reciprocidad socioemocional
4. No comparten emociones
5. El aleteo en manos
6. Movimientos rapidos en las manos
7. Uso repetitivos de objetos

Factores de riesgo

- Edad avanzada de padres
- Bajo peso al nacer
- Exposicion fetal al valproato

Se diagnostican mas en hombres

Diagnostico diferencial

- Discapacidad intelectual
- Esquizofrenia
- TDHA

3

## TICS

Condicion neurologica caracterizada por la presencia de movimientos o sonidos involuntarios

### TOURETTE

1. Los tics motores multiples e intermitentes

### TICS MOTORES

1. Pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero persisten durante mas de un año de aparicion

Empeoran con

- Ansiedad
- Emocion
- Cansancio

Diagnostico diferencial

- Distonia
- Corea
- Mioclonias

### TICS TRANSITORIOS

1. Los tics han estado presentes durante al menos un año de la aparicion

4

## DEFICIT DE ATENCION E HIPERACIVIDAD

1. Con frecuencia falla en prestar la debida atencion a detalle por descuido
2. Dificultad para mantener la atencion en tareas
3. Juguetea con las manos o los pies

Factores de riesgo

- Edad avanzada de padres
- Bajo peso al nacer
- Exposicion fetal al valproato

Se diagnostican mas en hombres

Diagnostico diferencial

- Transtorno negativista desafiante
- Transtorno explosivo intermitente

# **Bilbiografia**

Beach, S. R. H., Wamboldt, M. Z., Kaslow, N. J.,  
Heyman, R. E., B., M., Underwood, L. G., & Reiss, D.  
(Eds.). (2006). Relational processes and DSM-V:  
Neuroscience, assessment, prevention, and  
treatment. American Psychiatric Association  
Publishing.