



Royer Obed Ramírez López

Cuadro comparativo Facies

Primer Parcial

Semiología

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Licenciatura en Medicina Humana

Cuarto Semestre

# Facies

Fallo  
Renal



- Se observa edema periorbitario
- Pecho pálido e hinchado
- Labios inflamados

Lúpica



- Se observa erupción cutánea en forma de mariposa

Mongolide

- Ojos con fisuras palpebrales oblicuas y el pliegue epicántico



Caquética



- Se observa con palidez y relieves óseos marcados, con cara triste y cansada, con un tinte pardo-grisáceo
- Se ve en desnutrición y en neoplasias

Cianótica



- Coloración azulada o violácea de la piel y las membranas mucosas, causada por la falta de oxígeno en la sangre

## Parkinsoniana



- Expresión facial inexpressiva
- Una mirada lisa y falta de parpadeo debido a la rigidez y lentitud de los músculos faciales

## Síndrome de Cushing



- Rostro redondo, hinchado y enrojecido debido a la acumulación de grasa y al aumento de peso en la parte superior del cuerpo.

## Síndrome de Horner



- Parpado superior caído
- Miosis
- Anhidrosis

## Acromegalia



- Agrandamiento de la mandíbula y la frente
- Labios gruesos y lengua grande
- Nariz grande
- Dientes separados
- Fasgos faciales duros

# Hipertiroidismo



- \* Cara hinchada y de aspecto "empastado" o "bobo"
- \* Rostro con párpados hinchados, nariz y labios gruesos
- \* Inexpresividad y una palidez cerca con entorpecimiento de las "chapetas" malares

## Leonina



- \* Infiltración cutánea
- \* Acentuación de los rasgos faciales
- \* Arcos superciliares prominentes
- \* Madarosis

## Anémica



- \* Palidez de la piel y mucos.
- \* Ojeras pronunciadas, labios pálidos y un aspecto cansado y flaco.

