

**Mi Universidad**

**Flash Card**

*Casandra Solis Pinto*

*Parcial 1*

*Clínica Quirúrgica*

*Dr. Jhovanny Efraín Farrera Valdiviezo*

*Medicina Humana*

*Quinto Semestre*

*Comitán de Domínguez, Chiapas a 12 de Septiembre del 2025.*

[illegible]

**Toma:** Cortar o diseccionar algo.  
Ej: NEFROTOMIA.

**Ectomia:** Extraer algo.  
Ej: Tiroidectomia.

**Stomia:** Apertura de un lugar hueco.  
Ej: TRAQUEOSTOMIA.

**Plasia:** Cambiar una forma.  
Ej: RINOPLASTIA.

**Pexia:** Fijar o asegurar un organo a otro.  
Ej: COLECTOPEXIA.



# farmacos

## Según su función

- ANTIPIRETICOS**  
Tienen capacidad de reducir la fiebre.
- ANALGESICOS**  
Alivian el dolor físico producido por lesiones, golpes o heridas: opiáceos y No opiáceos.
- ANTIINFLAMATORIOS**  
Desinflan.
- MUCOLITICOS**  
Fluidifican y facilitan la expulsión del moco.
- EXPECTORANTES**  
Aumentan los movimientos de los bronquios para eliminar el moco.
- BRONCODILADORES**  
Relajan los músculos que rodean las vías aéreas y permiten que estas se dilaten.
- ANTIISTAMINICO**  
Combaten los efectos negativos de las reacciones alérgicas o la "hipersensibilidad".
- ANTIINFECCIOSOS**  
Antibióticos: bacterias. Antimicóticos: hongos.  
Antivirales: contra virus. Antiparasitarios: parásitos.
- ANTACIDOS**  
Combaten secreciones gástricas y la acidez.
- ANTIEMETICOS**  
Previenen o reducen las náuseas y los vómitos.
- HIPOTENSIVANTES**  
Disminuyen niveles de glucemia en sangre.
- ANTIHIPERTENSIVOS**  
Disminuyen riesgo cardiovascular.
- DIURETICOS**  
Aumentan la excreción de líquido por orina.
- ANESTESICOS**  
Pérdida temporal de la sensibilidad.

# Lavado de Manos Quirúrgico

- 1. Primer Tiempo:**  
Cepillar manos. Colocando jabón en el cepillo y posteriormente cepillamos los bordes interdigitales empezando del pulgar y terminando en el meñique. Para después cepillar la cara palmar y movimientos circulares y la cara dorsal igualmente en movimientos circulares. Luego cepillamos la articulación radiocarpiana en movimientos circulares. Siguiendo con el tercer miembro del antebrazo en dirección ascendente y descendente en movimientos laterales. Continuando con el tercio proximal del brazo y el brazo con el mismo movimiento.
  - 2. Segundo Tiempo:**  
Repetimos el mismo procedimiento pero el cepillado solo se realiza hasta el tercer miembro del antebrazo.
  - 3. Tercer Tiempo:**  
Repetimos el mismo procedimiento hasta la articulación radiocarpiana para terminar dejamos caer el cepillo y enjuagamos metiendo el brazo y si regresamos.
- Todo esto se realiza en ambos brazos manteniendo a la altura del tórax en calor para evitar contaminarse.

# Grados de Shock Hipovolémico

- GRADO I**  
→ Pérdida de sangre: < 15% (< 750 ml).  
→ Ex: Taquicardia leve, PA Normal.
- GRADO II**  
→ Pérdida de sangre: 15% - 30% (750 - 1500 ml).  
→ Ex: Taquicardia (> 100 lpm), taquiquies, presión de pulso disminuida; oliguria leve.
- GRADO III**  
→ Pérdida de sangre: 30% - 40% (1500 - 2000 ml).  
→ Ex: Hipotensión, Taquicardia severa (> 120 lpm), Estado mental alterado (confusión, letargo), oliguria.
- GRADO IV**  
→ Pérdida de sangre: > 40% (> 2000 ml).  
→ Ex: Hipotensión profunda, taquicardia extrema (> 140 lpm), agitación, incontinencia, pulso débil/ausente.

# Significado del Emblema de la Medicina

"**LA VIDA DE ASCESPIO**"  
Origen remoto en la mitología griega.

**Asclepio**  
Representa la autoridad y la guía.

**La Serpiente**  
Simboliza la curación y la renovación, ya que muda su piel.

**ASCESPIO?**  
Dios de la MEDICINA y la CURACIÓN.

# Posiciones Anatómicas

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Decúbito Dorsal o Supino          | Kraske o Janovic o Naraja. |
| Decúbito Prono o Ventral          | Reclinado                  |
| Decúbito Lateral Izq. o Der.      | Roser o Proctz.            |
| Posición de Sims.                 | Posición Fowler            |
| Trendelenburg.                    | Posición Semifowler        |
| Trendelenburg Invertido o Roeslin | Posición Ipsilateral       |
| Litotomía                         | Pos. on Contralateral      |
| Mahometana o Genupectoral         | Posición ortopnea          |

# Técnica de Antiseptia Quirúrgica de manos Con Preparación a Base de ALCOHOL

1. Poner en la palma de la mano izquierda la preparación de la mano derecha, y cuando el dedo índice de la mano izquierda se encuentre con el dedo índice de la mano derecha, se repite el movimiento.
2. Poner la punta de los dedos de la mano derecha en la preparación de la mano izquierda, y cuando el dedo índice de la mano derecha se encuentre con el dedo índice de la mano izquierda, se repite el movimiento.
3. Cubrir el antebrazo derecho hasta el codo con el producto (10 - 15 seg). Repetir el movimiento de cubrir toda el área con movimientos circulares.
4. Cubrir el antebrazo izquierdo hasta el codo con el producto (10 - 15 seg). Repetir el movimiento de cubrir toda el área con movimientos circulares.
5. Frotar el dorso de la mano izquierda con la preparación de la mano derecha, y cuando el dedo índice de la mano izquierda se encuentre con el dedo índice de la mano derecha, se repite el movimiento.
6. Frotar el dorso de la mano derecha con la preparación de la mano izquierda, y cuando el dedo índice de la mano derecha se encuentre con el dedo índice de la mano izquierda, se repite el movimiento.
7. Frotar la parte posterior de las manos con la preparación de la palma de la mano, y cuando el dedo índice de la mano izquierda se encuentre con el dedo índice de la mano derecha, se repite el movimiento.
8. Frotar la parte anterior de las manos con la preparación de la palma de la mano, y cuando el dedo índice de la mano izquierda se encuentre con el dedo índice de la mano derecha, se repite el movimiento.
9. Frotar el pulgar de la mano izquierda con la preparación de la mano derecha, y cuando el dedo índice de la mano izquierda se encuentre con el dedo índice de la mano derecha, se repite el movimiento.
10. Frotar el pulgar de la mano derecha con la preparación de la mano izquierda, y cuando el dedo índice de la mano derecha se encuentre con el dedo índice de la mano izquierda, se repite el movimiento.

# ¿Escala Analgética?


- OP → Opioides**
- Paso 1**  
DOLOR  
+/- Terapia intervencional (implantes para infusión de drogas; morfina epidural; bloqueos; neurolisis; quimio-radioterapia).
- Paso 2**  
OP Débil a Moderado  
Tramadol  
Piritina  
Dextropropriopetina
- Paso 3**  
OP Fuerte a Muy Fuerte  
Morfina  
Oxicodona  
Fentanilo  
Buprenorfina  
Codeína

# Sus 5 momentos para la higiene de manos


1. Antes del contacto con el paciente.
2. Antes de realizar una tarea aséptica.
3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.
4. Después del contacto con el paciente.
5. Después del contacto con el entorno del paciente.



# Áreas del Quirófano



# Contenido del Carrito Rojo



# TIPOS DE EXUDADOS

