



Universidad del Sureste
Campus Comitán de Domínguez
Licenciatura en Medicina Humana



Línea del tiempo

Jorge Ángel Mendoza Toledo
Dr. Jhovanny Efraín Farrera Valdiviezo
Clínica Quirúrgica
Cuarto Semestre, Grupo: "C"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 12 de septiembre de

En mesopotamia: Código Hammurabi:
Código xx a.c.). Este retribuía o castigaba al médico dependiendo del éxito o fracaso

Hipócrates Fue el máximo exponente de la medicina griega

En 1889 William Haster propuso el uso de los guantes quirúrgicos

Andrés Bessar es el Padre de la anatomía

Joseph Lister es el padre de la medicina moderna

En la India se cree y considera la creadora de instrumentos

Dosis PONDERALES

Dosis general de los AINS

- paracetamol	10 -15 mg /x/d	60mg 1x d 1d
- Ibuprofeno	5 -10 "	20 "
- Metamizol	10 -15 "	60 "
- Ketorolaco	0.25 "	1 "
- Naproxeno	5-7 "	1000 mg/d:q
- AsA	30-65 "	
- Indometacina	25 mg	
- Diclofenaco	60 mg 1x d:q , 1/3 cada	200 mg
- Meloxicam	7,5-15 mg 1x d:q	225 mg
- Celecoxib	200mg 1x d:q o 100M x 2d	200mg

Scribe®

Escala
Analgesica
de la
OMS

Se divide por escalones:
1er escalon (No opioideos)
paracetamol, Metamizol,
Ibuprofeno (600), diclofenaco,
coadyuvante

P- <4g
M- 500mg c/8
1- 1c/6 u/8
0- 2/3 al dia

2do escalon Opioideos debiles +
NO opioideos)

- Tramadol
- pethidina
- pentazocina

T-25m x 406 h:s
400mg
P- 50 a 100mg
600mg x d:q

3 er escalon opioides que son potentes cras:cos + NO opio-ides)

- Morfina
- Oxicodeona
- Hidromorfina
- Pentamio
- Coadyuvante

4 b combinaciones,
bloqueo nervioso)
Anestesia Epidual

- - Ad. Infraneurales de anestesicos
- Anestesicos locales
- procedimientos neuroquirurgicos

Adyuvantes

- Antidepresivos tricíclicos.
- C Amitriptilina, Nortriptilina
- Inhibidores de la reuptación de serotonina y norepinefrina
- C Duloxetina, venlafaxina

- Anticonvulsivos
- C Gabapentina,
- P regabatina
- Anestesicos topicos
- C Lidocaina

- In teracciones con opioides
- NO combinar con inhibidor de la amonoxidasa

- La asociación de IRS con antidepresivos tre

(dijo, qué?)

CONVULSIONES ←

Causan ↗

Áreas de QUIRÓFANO

Se dividen por zonas:
- Negra, Gris y Blanca

Hablemos de la Zona Negra:
- Es una zona de acceso de recepción del paciente
y el personal

Trompa de bata y
camilla

Acceso con
bata limpia

Cubículo de adm.
9x

Colocación de
ropa quirúrgica

báños ← Vestidores

Zona Gris

Esta es el área
de el lavado
quirúrgico

También donde se esteriliza
central de equipos

Cuarto de anestesia

Sala de recuperación
post operatoria

Cuarto de rayos X

Cuartos septicos

Ventanilla pequeña

Sala de enfermería

Zona Bianca

Esta es la sala
con la mayor
Restricción

Es la sala de los
Operaciones

Tiene un tamaño de
 6×6

Temperatura de 20°C

Luz Blanca

Buena Ventilación

↓
con


↓
puertas abatibles

↓
paredes y un techo duros
y curvos


AlkaZyme

¿Cuál es la preparación? El lavado instrumental
se debe preparar la solución

4L de agua en un recipiente con una tapa




Se somerge sin romper 20g




Se mezcla

Se debe de somergir los materiales al rededor de 15 minutos



Se retiran los apuritos y el propó enjuaga



Se debe de secar

Limpieza de superficies
con bio carga
la solución

→ sumerja el trapo en

y se usa las
veces que se
crean necesarias

Enjuagar con ←
agua (H_2O)

↓
Aplicar el
trapo en
la
superficie
y dejar 15
minutos

Derrames → En este punto se aplica directamente

↓
se deja reposar
entre 5 y 10
minutos para
limpiar con
toallas

G5 lo se deposita
en bolsa
roja

→ y se enjuaga con agua

Beneficios y la Compensación

De manera beneficiosa
-Gs de acción inmediata
con ph alcalino y
rinde hasta 48
litros

Composición
Enzimas proteicas
↓
Agentes
absorbentes
de colágeno

Amonio cuaternario ←

↓
Agentes
tensioactivos

AirKacide

Scribb

¿Qué es? → Gs on desinfectante de
cultivo p; ves

¿De qué está compuesta? Alotaracido
potenciado

¿Qué tan seguro es?

- No es tóxico
- No es corrosivo
- No causa irritación

Gs on Material quirúrgico:

- H. endoscop.9
- De material termosensible

¿Cuáles son sus propiedades?

- Es un bactericida
- P. aeruginosa 15
- S. aureus 15
- E. coli 5
- M. tuberculosis 15
- Es un fungicida
- Candida albicans 15
- Aspergillus
- Formigas 15
- C. Abbas A1

Es un virusido:

- Adenovirus 15
- VIH -1 5
- Parvovirus 5
- H. virus 1 5

Es un esporicida

y actua contra
priones

¿Cómo se Utiliza?

En un recipiente con 1 L de agua y con una tapa se le agrega unos 20ml de Alkacide

Se une al recipiente con agua

y se seca con tec. esteril.

Despues se enjuaga con mucha agua

↓
Despues de 11 minutos de el agua con el Alkacide se sumerge al rededor de uno 15 minutos

¿Qué es? → Es una remoción química de microorganismos que destruyen o matan la flora transitoria

pasos 1: 1. Tomar el cepillo y humedecer las manos

5. Cepillar de manera circular las palmas y el dorso

→ 6. Cepillar las caras interfa-
lancicas

→ 2. Dispensar el jabón sobre las cerdas del cepillo

↑
manera circular 100 órbs qd
Menos 5 veces

4. Cepillar de

3. En la palma de la mano Crearona crema
en la cual hara todo el trabajo

LAVADO DE MANOS QX

7. Cepillar el brazo y el antebrazo de distal a proximal y de manera circular

↓
8. Enjuagar de distal a proximal de forma consistente, sin regresar al lugar donde ya se paso

→ - Tercer tiempo

Articulación radio metacarpiana

¿Cuántos tiempos existen?
-3

¿Cuáles son?

- primer tiempo
Del tercio distal del brazo

- segundo tiempo
- Tercio medio del antebrazo

Accesorios de la óptica
de operaciones

Tipos de mesa

- Mesa de operaciones de multiplicación
- Mesa de pasteur
- Mesa de pasteur
- Mesa de mayo



- trípode o trípode
- Lámpara qx
- Bancos de reposo y altura
- Equipos de anestesia en quirófano
- Unidad de electrocoagulación
- Unidad de rayo laser
- Equipos adicionales

Cubetas

- 3 cubetas de perfusión
- Una con bolsa negra
- Una con bolsa roja
- Una con bolsa amarilla

CLASES

C) Qué es Cirugía?

Todo procedimiento realizado en quirófano, que permite la incisión, ección, manipulación o sutura de un tejido, por lo general este mismo requiere de anestesia.


Quinolonas de 4ta

linea:

- Ciprofloxacino
C (Este afecta al cartílago de crecimiento)

Sangre:

- Recién nacido: 75 ml / kg
- L.M.: 75 - 100 ml
- LLNA: 75 - 85 ml
- ADU: 4.5 a 5.5 L
- Adu: 5 - 6 L



Grados ↗

- primer grado:

- superficial

- Epidermica

- Eritema

- Dolor leve o intenso

- segundo grado ↗

D. sup:

- Rojiza

- Exudativa

- Dolor

intenso

D. profunda:

- Lisa y brillante

- Exudativa

- Rosada o blanda

- De dolor leve

- De tercer grado → Tendon, Ancorada, obs,
mus y → o negro
hueso