



Mi Universidad

INFOGRAFIA

Briseida Guadalupe Torres Zamorano

Ier Parcial

Pediatría

Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Licenciatura en Medicina Humana

6° "A"

Comitán de Domínguez, Chis, A 8 de septiembre de 2025

Atención del Recién Nacido

Vigilancia del estado de salud del recién nacido durante los primeros 28 días de vida, con acciones preventivas y diagnósticas.

- Conocimiento sobre reanimación neonatal



Vitamina K

1 mg IM
Aplicación para prevención de cuadros hemorrágicos



- Prevención de la oftalmía purulenta

Aplicar 2 gotas de cloranfenicol oftálmico en cada ojo.



- Manejo correcto del cordón umbilical



- Aplicación de tablas

Escala de Apgar

- se realiza 1er minuto de vida para determinar o no la presencia de asfixia neonatal

- 5 minutos. Determina la efectividad de las medidas de reanimación al igual que nos ayuda a establecer el riesgo de secuela a futuro.

- 10-7 = Buen estado de adaptación
- 6-4 = Moderadamente deprimido
- 2-3 = Severamente deprimido

A P G A R

Apariencia Pulso Actividad Respiración Gestación

Escala Silverman

Anderson

- utilizado para cuantificar la presencia y gravedad de la insuficiencia respiratoria

0 puntos: No hay dificultad
1 a 3 pts: Dificultad leve
4 a 6: Dificultad moderada
7: Dificultad severa

Test caporro

- Herramienta clínica que se utiliza para estimar la edad gestacional de los RN



- Forma de la orela



- Tamaño de Glándula mamaria



- Formación del pezón



- Textura de la piel



- Pliegues plantares

Bibliografía

- Secretaría de Salud. (2016). NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Diario Oficial de la Federación.