



# **Licenciatura en medicina humana**

**Carlos Fernando Ruiz Ballinas**

**Dra. Karla Sofia López Gutiérrez**

**Infografía**

**Pediatría**


**6° “A”**

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de septiembre del 2025.

## NOM-007-SSA2-2016: Atención inmediata del RN

La recepción del RN debe de realizarse en una zona limpia, cálida, y segura con todo el material estéril.

Debe de colocar al RN sobre el abdomen materno o pecho materno inmediatamente evitando la separación.



En los primeros segundos se revisa si el neonato tiene tono y frecuencia cardíaca adecuada. Se debe aplicar la escala de Apgar al minuto y a los 5 minutos, de acuerdo a los resultados se decide continuar observación o iniciar maniobras de reanimación.

Cuidados inmediatos esenciales:

Via aérea permeable, aspiración si hay secreción

Compresión y corte del cordón entre 1 y 3 minutos

Profilaxis ocular antibiótica para prevenir Oculitis neonatal

Vitamina K IM (Ang)

Identificación inmediata con brazalete y huella plantar.



Precaución en hipotermia:

- Contacto piel a piel (nude canguro)
- Cubrir con manta y gorro
- Evitar baño en primeros 24 hrs
- Evitar el separo de madre

La NOM indica la lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida, hasta un máximo de 24 meses.

## Referencias

NOM-007-SSA2-2016: ATENCION INMEDIATA DEL RN