



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
CAMPUS COMITAN DE DOMINGUEZ**

Nombre del Alumno:

Ugarte Venegas C.de Jesus.

Catedratico:

Dra. Karla Sofia Lopez Gutierrez.

Asignatura:

Pediatria.

Evidencia/ Actividad:

Infograma “Pasos Iniciales atencion del RN”

Semestre:

Sexto Semestre, Unidad No.1

Elegir a la Persona P.H.

Indicar a la persn recien nacida vivi; implica respetar al momento del nacimiento.

1ra Consulta entre 3 y 5 días
2da Consulta 28 días postnoves



Para la evaluación y registro examen antropométrico,
↓
Tablas OTS vigentes



| Estado Neuromuscular |
|--------------------------|
| Piebrazos |
| - Moro |
| - Gálibelar |
| - Búsqueda |
| - Succión |
| - Deglución |
| - Presión Palmar/Plantar |
| - Flexión |
| - Tono |
| - Osteofendinosis |

Se eliminará rotinamente, solo por indicación médica.

Aspiración de secreción con sonda

Lavado gástrico

Agono (evitar >4 hrs)

Adm Sol. glucosadas NO, agua & fórmula

Biberón

Separación Binomio Madre-Hijo.

Tamiz Hépatobético Neonatal

Muestra del Talón
(72 hrs - 5 días)



Tamiz Cardiológico

Dx de las 7 cardiopatías congénitas más comunes.

> 6 hrs ó antes 48 hrs vida.

Mediante Oxímetria

✓ > 94% / 90-94% → repetir 1 hora.

X < 90% → Ecocardiograma e intervista.

Tamiz

Audiológico:

Detección Hipacusia
Neurosensorial.

EDA y PEATC

Evaluación antes del mes para oportuna intervención < 6 meses.

Tipo de establecimiento para la atención obstétrica, debe incluir:

- Recién nacido neonatal
- Mancha Cardíaca Omblícal
- Apgar Silverman Anderson
- Prueba Hemorragia con Vit K 1mg IM
- Prueba oftalmopatina puntada
- Macronutriente
- Examen físico y antropometria
- Valoración Física Gestacional y Nudos neurologicos. Capullo o Ballot.

Se recomienda:

Inj rotinamente grupo 4BO, factor Rho(D), su variante de la D, Antiglobulina directa o prueba de Coombs



Madre Rh- → Rx Isoimmunización

Alojamiento Conjunto

Vigilar y toma SV por lo menos una vez por turno (1/8 hrs), extra decolorante mental.

24 hrs; restringir membranas reumáticas, preferir noche o postérmino.

PROMOVER LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA.

Durante primeros 6 meses, promover complementariamente hasta los 2 años.

Tamiz Oftalmológico

Antecedentes familiares:

- Albinismo
- Lesiones cerebrales
- Sx de Down
- Hidrocefalia
- Enf infecciosas.
- Binocular "Brocknen" Simetría de alineación y errores refractivos.
- Reflejo Rojo < 24 hrs ó 6sem vida.

Dx Cataratas congénitas, curva fisiológica más común.