



Efraín de Jesús Gordillo García

CONTROL PRENATAL

GYO

7ºA

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas

Primera consulta

Duración: 30-40 min

HC:

Exploración física

Exploración ginecoobstetrica.

Ultrasonido para fecha probable de parto

PESO DE LA MADRE

PIE

En época invernal aplicar vacuna de influenza,

Primera vacuna de tétanos y difteria.

AFU: 20 semanas

LAB: grupo y RH, BH, TAMIZ SEROLOGICO: (RUBÉOLA, VARICELA, SÍFILIS, cancer cervical) EGO, prueba de VIH, HEPATITIS B, CHLAMYDIA, QS, VDRL

Exploración ginecoobstetrico

Segunda consulta

Duración: 20 min

BH

CONFIRMAR FPP y dúo test: Por USG

OMEGA

Tamízame: diabetes para diagnóstico de DM2 pre gestacional Semana 13 de gestación

Segunda dosis de vacuna contra tétanos y difteria.

Medición de la presión arterial

Altura del fondo uterino

EGO

Medición del peso corporal

TA

USG: edad gestacional, número de fotos aneuploidia

EG: longitud cefalocaudal

Tercera consulta

Laboratorios: BH, EGO Y UROCULTIVO

USG: detectar anormalidades

Triple test

EF

6-8semanas

10-13.6 semanas

16-18 semanas

Cuarta consulta

Duración: 20 min

Revisar estudios de laboratorios y gabinetes solicitados en la primera consulta consultas previas.

Comenzar suplementación con hierro si se encuentra anemia: 30-60 mg

Ultrasonido: Para descartar placenta previa

Tamizaje para diabetes gestacional.

Vitamina D: 601 UI

Vacuna TDPA: 3 dosis

TA:> 140/90 mmHg para alteraciones de hipertensión

USG: vitalidad anomalía fetal,y malformaciones , estructural

EG: diámetro bisártela

Quinta consulta

Duración: 20 min

LAB: previos

Detectar embarazadas que requieran cuidados especiales

Diagnóstico de DM2 gestacional (semana de la 24-28

4 dosis de TDPA

Ig anti D

Sexta consulta

LAB: BH, tiempos de coagulación

Buscar infección por streptococo grupo B por cultivo

USG : alteraciones de crecimiento cefálica o abdominal

Semana 22

28 semanas

32 semanas

Vacunas permitidas

Cavid

VSG

HEPATITIS

MENINGOCOCO

Séptima consulta

Duración: 20 min

Mediciones y registros cotidianos

USG para defectos del producto

Es tomar peso fetal por método johson

Si hay presencia de streptococo grupo B profilaxis intra parto

LAB: BH, QS, EGO, UROCULTIVO

Maniobras de Leopold

Octava consulta

Duración: 20 min

Ultima dosis de TDPA

Brindar educación sobre medidas preventivas post-maduro

Referir a segundo nivel: Urgencias gineco-obstetricas para evaluar inducción.

Pacientes > 40 SDG Enviar a urgencias para inducción de parto

36 semanas

38-41 semanas

