



**Nombre del alumno: Carlos Mario Pérez López**

**Nombre del profesor: Erick Antonio Flores Gutiérrez**

**Nombre del trabajo: Flashcards**

**Materia: quirúrgica**

**Grado: 7mo**

**Grupo: “B”**

## Parálisis e inducción

- Uso de fármacos endos de inducción
- Se determina por el escenario clínico

## Medicamentos:

- Barbitúricos
- opioides
- Benzodiazepinas
- Relajantes
- Rocuronio
- Vecuronio

Sedante

- \* Fentanilo
- \* Ketamina
- \* Midazolam

Etomidato: Anestésico de acción corta

Ketamina: Anestésico

Propofol: Anestesia general.

En la preoxigenación

- Se debe tener adecuada ventilación y evitar apnea e hipoxia.

**Ambu**: Se debe realizar con insuflaciones suaves durante 5 minutos.

- Comer el cable:
- succión, mascarilla de alto flujo
- Posicionar medicamentos

## Cuidados del Paciente:

Rad.ografía de tórax

- Monitoreo hemodinámico
- Analgesia
- Aspirar todo
- Fijar tubo

## Contraindicaciones

- Si hay una obstrucción de la vía aérea
- Incapacidad para intubar
- Hemorragia u sangrado de la vía aérea
- Malformaciones.

**A** Indagar lesión externa  
**C** Clasificar hipofaringe  
**C** Obstrucción por infección-trauma  
**E** Immobilizar el cuello.  
**S**  
**O**  
**D**  
**I**  
**F**  
**I**  
**C**  
**I**  
**L**

## ¿Cómo se Posiciona el tubo?

Se coloca en la tráquea del paciente insertando a través de la boca (orotraqueal, endotraqueal).

Paciente se encuentra bajo sedación

**B** **UP** **H** **I**  
**a** **C** **E** **I**  
**C** **a** **d** **e**  
**H** **q** **u** **e**  
**t** **a** **c** **i**

Esto nos ayuda a ver la glotis  
sedesela la glotis sobre  
cartilago tiroideo haciendo  
presión hacia atrás

**Posición:** Se encarga de alinear 3 ejes  
 - Oral Extiende y eleva el cuello  
 - Faringea  
 - Laríngea.

## Protección:

En esta etapa se usan maniobras para prevenir  
aspiración y distensión gástrica

Manobra "Sellick" También conocida  
como Presión cricoidea. Para evitar la  
aspiración del producto gástrico.

