



Mi Universidad

Flash cards de secuencia Rápido de incubación

Nombre de la alumna: Diana Rocio Gómez López

Nombre del docente: Dr. Flores Gutiérrez Erick Antonio

parcial: 3er parcial

Grado: 7mo

Grupo: D

Materia : clínicas quirurgicas complementarias

SECUENCIA RÁPIDA DE INTUBACIÓN

①

ETAPAS DEL SRI

6-10 MIN

PREPARACIÓN

PREOXIGENACIÓN 3-5 MIN

PRETRATAMIENTO

PARALISIS E INDUCCIÓN 1-2 MIN

7 P ->

PROTECCIÓN Y POSICIÓN
POSICIÓN DEL TUBO

{ 60
90 SEG

COIDADOS POSTINTUBACIÓN

PREPARACIÓN

- ASIGNAR FUNCIONES A CADA UNO
- PREPARAR MATERIALES (EQUIPOS MONITORIZACIÓN Y REANIMACIÓN)
- PREPARAR MEDICAMENTOS
- PREPARARSE SI EXISTE ALGUNA COMPLICACIÓN

SOAPME

A SUCCIÓN → MANGUERAS

OXÍGENO → MASCARILLA, FUENTES PARA O2

AIRE / VÍA AEREA → DISPOSITIVO

POSICIÓN → OLFATO SUPINO

MEDICAMENTOS → FARMACOS

EQUIPO DE VENTILACIÓN → LARINGOSCOPIO Y
COMPRESORES

VALORACIÓN VÍA AEREA
LEMON:

LESIONES EXTERNAS VALORAN

EVALUAR REGLA 3,3,2

MALLAMPATI VALORAN

OBSTRUCCIÓN INFECCIONADO/MECÁNICO

NO MOVILIZACIÓN DEL CUERPO

PREOXYGENACIÓN

VENTILACIÓN MANUAL CON AMBÚ

④ 5 MIN

10-115 LITROS X MINUTO DEJAR LIBRE

EVITAR DESATURACIÓN E HIPOXIA, HIPERINSUFLACIÓN ΔV $\frac{V}{V}$

PRETRATAMIENTO

MITIGAR RESPUESTA FISIOLOGICAS QUE PRODUCEN

 $\begin{matrix} \uparrow \text{TAQ} \\ \text{HA} \\ \text{PIC} \end{matrix}$
 I

ANTES DE LA INDUCCIÓN: LOAD

LIDOCAINA 1.5 mg / Kg / Peso \rightarrow \uparrow ACT BRONQUIAL O PICOPIOIDES FENTANICO 2-3 mg / Kg / Peso \downarrow RESP. SIMPÁTICA

ATROFOPINA 0.02 mg / Kg PREVENIR BRADICARDIA EN PEDIATRICO

DOSIS DESFAJICANTE DE BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR SUCCINICOLINA ④ 22

PARACÍSIS E INDUCCIÓN

INDUCCIÓN - SEDACIÓN

OPIOIDES: ETOMIDATO (NO BARBITÁTICO)

IPNOTICO + UTILIZADO X NO AFECTA ESTADO HEMO

PX CON TCE ASOCIADO HEMORRAGIA O SHOCK

④ 11-8 HIDROXICASA

HIPOVOLEMICO

0.2 - 0.4 mg / Kg

KETAMINA ANALGÉSICO, LIBERA LÁTECOLAMINA
PX - HIPOTENSOS O TCE

1-2 mg/kg

PROPOFOL SEDANTE - HIPNOTICO ACCIÓN ULTRACORTA ANTIHEMÉTICO
PRODUCE HIPOTENCIÓN, BRADICARDIA, HIPOXEMIA, APNEA

1-2.5 mg/kg

BURBITURICOS TIPENTAL + UDADO — ↓ FLUJO SANGUINEO
PX TCE Y PIC ESTABLE, CRÍOS EPILEPTICAS

3-5 mg/kg

BENZODIAZEPINA (MIDAZOLAM + UDADO + RÁPIDO NO PRIMERA LINEA
EFECTOS CARDIOVASCULARES EN PX HIPONOLEMICOS 0.1 - 0.2 mg/kg

PARALISIS

SUCCINILCOLINA IDEAL 1-2 mg/kg SIMILAR ACETIC COLINA DEPOLARIZANTE
EFECTOS ADVERSOS: HIPERACEMIA

FASICOCLACIONES

PIC, I

HIPERTERMIA MALIGNA

ROCURONIO NO DESPOLARIZANTE BLOQUEA ACH
1-1,2 mg / Kg RAPIDO 45-60 SEC

Ø CONTRAINDICACIONES

PROTECCIÓN Y POSICIÓN

POSICIÓN ALINEA EJES: ORAL, FARINGEO Y LARINGEO MEDIANTE ELEVACIÓN LOGRAR → VOLFATEO 60-90 SEG Ø EXTENCIÓN

PROTECCIÓN — MANIOBRA **SECCION** PREVENIR DISTENCIÓN GASTRICA ASPIRACIÓN GASTRICA BRONCOPNEUMONIA
COMPRECCIÓN → CARTÍLAGO CRICOIDEO EN LOS ANILLOS TRAQUEALES

MANIOBRA **BURP** → VER Ø Ø CAVITIS [PRECIONAR  Y ARRIBA A LA DERECHA

CUIDADOS POST INTUBACIÓN ③

② FIJAR EL TUBO — AUSCULTAR
RADIOGRAFIA DE TORAX
MONITOREAR
CAPNOGRAFIA ①

hipotensión post intubación
descarta, neumotorax