



**- FLASHCARDS: ETAPAS DEL SRI.**

**NOMBRE DEL ALUMNO:**

VIRGINIA GUADALUPE CABRERA MALDONADO.

**DOCENTE:**

DR. ERICK ANTONIO FLORES GUTIÉRREZ.

**PARCIAL:** 1° PARCIAL.


**SEMESTRE:** 7° **GRUPO:** D

**NOMBRE DE LA MATERIA:**

CLÍNICAS QUIRÚRGICAS COMPLEMENTARIAS.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

## ETAPAS DEL SRI



## SECUENCIA RÁPIDA DE INTUBACIÓN (SRI)

### PREPARACIÓN

- ORGANIZA EL EQUIPO DE SALUD.
- \* Preparación para situación de INTUBACIÓN Y VENTILACIÓN FALTA.

SUCIÓN: ACCESIBLE.

OXÍGENO: MASCARILLA ALTO FLUJO.

Vía AÉREA: RIGADO.

POSICIÓN: OLFATEO.

MEDICAMENTOS / MONITOREO.

EQUIPO: LARINGOSCOPIO / HOJAS / TUBOS.

### CLASIFICACIÓN MALLAMPATI

GRADOS



I

II

III

IV

L	I	M	O	N
ESLON	NUEST	ALAM	BESTRUC	OMOVIL
EXT.	IGO	PA	OC	LA
	(352)	I	ON	DA

## PREOXIGENACIÓN

→ OBJETIVO: EVITAR DESATURACIÓN E HIPOXIA TISULAR DURANTE LA APNEA.

EVITANDO LA HIPERINSUFICIENCIA PULMONAR Y GÁSTRICA



FRECUENCIA ↓

VOLUMENES ↓

INSUFLACIONES SUAVES.

PRESSIÓN CRICOTÓDEO.

5 min

EMERGENCIA.

## PRETREATAMIENTO

→ MITIGAR ESTA RESPUESTA FISIOLÓGICA QUE PRODUCE UNO POTENTE DESCARGA ADRENÉGICA.

LIDOCALINA (1,5 mg/kg peso)

OPIODOS. (2-3 µg/kg peso)

ATROPINA. (0,02 mg/kg).

DOSIS DESFASICULANTE/BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR.



## PARÁISIS E INDUCCIÓN

→ ADMINISTRACIÓN SUCCESSIONAL RÁPIDA DE UNA PRUEBA SEGUENTE EN INDUCCIÓN.

### SEDANTES

BARBITÚRICOS / NO B.

OPIODOS

AGENTES DÍJOC.

BENZODIACERÍNOS

### RELAJANTES MUSCULARES

DESPOLARIZANTES

\* SUCCINICOLINA.

No DESPOLARIZANTES

\* VEKURONIO / ROVURONIO

**ETOMIDATO.** EFECTO HIPNÓTICO.

0.2-0.4 mg/kg ↗ Px con TCE (Hemorragia / SHOCK)  
\* INHIBE 11-B-HIDROXILASA.

**KETOMINA.** EFECTO ANALGÉSICO.

1-2 mg/kg ↗ Px, HIPOTENSOS, / TEC.  
\* LIBERA CATECOLAMINAS

**PROPOFOL.** SEDANTE - HIPNÓTICO

1-2.5 mg/kg ↗ HIPOTENSIÓN ARTERIAL /  
Bрадикардия / Hipoxemia /  
APNEA.

**BREBITÚRICOS.** ↗ TROPICAL (ANESTESIA)

3-5 mg/kg ↗ ↓ FSC  
Px con TEC / HENDOCRAN.

**BENZODIACEPÍNOS.** SEDATIVOS, HIPNÓTICOS /

**DIAZEPAM** ANESTÉSICOS / ANSOLÍTICOS /  
NO PSEUDOAG.  
(0.1-0.2 mg/kg) ANTI CONVULSIVOS / RELAJANTES  
MUSCULARES.

**SUCCINILCOLINA.** Despolarizante.

1-2 mg/kg ↗ \* Paralizante IDEAL

EFECTOS ADVERSOS:

↑ HIPERKALEMIA / ↑ PRESIÓN  
INTRACR. / INTRACR. /  
FLACCICULACIÓN / HIPERTERMIA  
MALIGNA.

**RROSURONIO.**

1-1.2 mg/kg ↗ BLOQUEO COMPETITIVO NACH.

SIN CONTRAINDICACION.

Protección y Posicionamiento.

ALINEAR  
EJES O

\* ORL.

\* Faríngeo

\* Laringeo.

MANTENER DE  
SEGURO.



AFATO.

PREVIENE DISTENSIÓN  
GÁSTRICA Y ASP. GAST. GAST.

## Posicionamiento del tubo

Procedimiento  
de intubación  
bajo sedación

- Relajación mandibular y relaxación.
- Laringoscopias subóptimas.

## Movimiento BURP

- Despuete laringe.
- Presión contínuo tiroídes

\* ATRAS / ARRIBA / DERECHA.

## Cuidados posintubación

### MONITOREO DE EFECTOS hemodinámicos

- \* Rx. Tórax
- \* Hipotensión posintubación