

Enfermedades Exantemáticas

Cuadro Comparativo

Enfermedad	Agente etiológico	Periodo de incubación	Clínica principal	Características del exantema	Diagnóstico	Tratamiento
Sarampión	Paramyxovirus (Virus del Sarampión)	10–14 días	Fiebre alta, tos, coriza, conjuntivitis.	Erupción maculopapular cefalocaudal.	Clínico y laboratorio (IGM/PCR).	Soporte + vacunación.
Escarlatina	Togavirus (Virus de la Rubiola)	14–21 días	Adenopatía retroauricular, fiebre.	Exantema rosado maculopapular.	Clínico y laboratorio (IGM/PCR).	Soporte.
Varicela	Virus Varicela-Zóster (VZV)	10–21 días	Fiebre, malestar, prurito.	Vesículas en ‘gota de rocío’.	Clínico.	Aciclovir en casos graves.
Escarlatina	Streptococcus pyogenes	1–5 días	Faringitis, fiebre, lengua aframbuesada.	Erupción tipo lija + líneas de Pastia.	Prueba rápida/cultivo.	Penicilina.
Exantema infeccioso	Parvovirus B19	4–14 días	Malestar, artralgias.	Mejillas abofeteadas + patrón en guante.	Clínico.	Soporte.
Rubeola	HHV-6	9–10 días	Fiebre alta súbita.	Exantema al bajar la fiebre.	Clínico.	Soporte.