



Universidad del sureste
Campus Comitán
Medicina Humana



Nombre de la alumna: Rosario Lara Vega

Nombre del catedrático: Dra. Celeste Azucena Gordillo

Materia: Medicina Basada en Evidencias

UDS
Mi Universidad

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de Octubre de 2025

Escala de Bishop

Parametro	0pts	1pts	2pts	3pts
Dilatación	Cerrado	1-5	3-4	≥ 5
Borramiento	0-30	40-50	60-70	≥ 80
Consistencia	Firme	Media	Blanda	-
Posición	Posterior	Media	Anterior	-
Estación	-3	-2	-1/0	+1/+3

≤ 5pts cuello inmaduro no cielo está indicación

6-8 pts madurez intermedia puede considerarse indicación

≥ 9 pts cuello favorable alta probabilidad de éxito exitoso con indicación

Maniobras de Leopold

Situación fetal: longitudinal, transversa o oblicua

Posición: Dorso a la derecha o ala izquierda

Presentación: Cefálica, Pediátrica o de hombro

Encasamiento: Grado de encasamiento

Aborto

Interrupción del embarazo antes de la SOD 23
o cuando el producto pesa <500g.

Aborto espontáneo

Se produce sin intervención externa, generalmente por causas naturales como anomalías, infecciones, enf maternas o traumatismos.

Aborto Inducido

Es la interrupción voluntaria del embarazo mediante medios médicos, quirúrgicos o farmacológicos.

Aborto en evolución (inevitabile)

Sangrado abundante y dolor intenso, el cuello uterino está dilatado y la pérdida del embarazo es inevitable.

Aborto incompleto

Expulsión parcial del contenido uterino persisten tanto óvulos dentro del útero, erosión de cérvix y sangrado.

Aborto completo

Expulsión total del producto y sus areños.

Aborto difuso

Muerte del embrión o feto sin expulsión del contenido uterino

Aborto Segundo

Comunicación con infección uterina o sistémica.

Amenaza de aborto

Dolor abdominal, sangrado vaginal antes de la vigesima SOD con o sin contracciones uterinas, sin dilatación cervical y sin expulsión del producto.

Planas de Hodge

1. Pasa por el borde superior de la sinfisis del pubis hasta el promontorio del sacro

2. Pasa por el borde inferior de la sinfisis del pubis hasta la segunda vértebra sacra

3. Pasa por las espinas ciáticas

4. Pasa por el vértice del sacro hasta la espinilla del cocix.

Silverman - Andersen

	0pts	1pts	2pts	3pts
Movimientos toracocostal	normal y abnormales	Potente	Muy intenso	Nacimiento: BCG - Hepatitis B dosis única
Traje nictemero	ausente	leve	intenso	2 meses: DTPa - Dosis 3 unica Rotavirus - Una dosis
Retención x: Edad	ausente	leve	Moderado	Neumonía conjugada - una dosis Hepatitis B - 2 dosis
Aleteo nasal	ausente	presente	Moderado	
Quejido respiratorio	ausente	ocasional	Doloroso	4 meses: Pentavalente - 2 dosis Polio - 2 dosis Neumonía conjugada - 2 dosis
1-3 pts Dificultad respiratoria leve				
4-6 pts Dificultad respiratoria moderada				6 meses: Pentavalente acelular - 3 dosis Hepatitis B - 3 dosis Influenza estacional - 1 dosis
7-10 pts Dificultad respiratoria severa				7 meses: Influenza estacional - 2 dosis

Signos vitales

FC: 120-160 lpm

PR: 30-60 Rpm

TC: 36.5°C - 37.5°C

PD: 60-80mmHg

SpO₂ >90%

Escala de Vacunación

Nacimiento: BCG - Hepatitis B dosis única
2 meses: DTPa - Dosis 3 unica Rotavirus - Una dosis
Neumonía conjugada - una dosis Hepatitis B - 2 dosis
4 meses: Pentavalente - 2 dosis Polio - 2 dosis Neumonía conjugada - 2 dosis
6 meses: Pentavalente acelular - 3 dosis Hepatitis B - 3 dosis Influenza estacional - 1 dosis
7 meses: Influenza estacional - 2 dosis
1 año: SRP - 1 dosis Neumonía conjugada - Refuerzo

18 meses: Pentavalente acelular - Refuerzo final

4 años: DPT - Refuerzo

5 años: SRP - 2 dosis