



Mi Universidad

REPRODUCCIÓN.

Nombre del Alumno: Ximena Yudith Morales Maldonado.

Nombre del tema: Estática fetal

Unidad: I

Nombre de la Materia: reproducción.

Nombre del profesor: Guillermo Montesinos Moguel.

Cuatrimestre: IV

ESTÁTICA FETAL

- La **estática fetal** es la relación que guarda el feto con el útero materno durante el parto. Se analiza a través de 3 aspectos Principales:

1. **Presentación**: parte del feto que se orienta hacia el canal del parto (anterior, posterior o transversal).
2. **Posición**: Relación entre el dorso fetal y el de la madre (dorso, xano, dorso pábico, dorso laq o decaho).
3. **Actitud o postura**: Disposición de la cabeza, cuello y extremidades (flexionadas o extendidas).

La **estática fetal** es crucial porque determina si el parto será normal o dabiico.


CANINO y FELINO



En perros y gatos la **estática fetal** normal corresponde a la **presentación anterior** en **postura agallana**, en la cual la cabeza y los miembros anteriores se extienden hacia el canal del parto. Esta disposición facilita la dilatación de la vagina y la progresión de los cachorros agallitos hacia el exterior. También puede ocurrir la **presentación posterior** (con **extremidades posteriores primero**) y en la mayoría de los casos se considera normal y no necesariamente patológica.

Importancia: En estas especies, la **estática fetal** correcta permite partos fluidos y reduce complicaciones. Sin embargo en razas braquicefálicas de perros (Bulldog, Pug, Boston Terrier) y en gatos de cráneo ancho (como los persas) la proporción desfavorable entre el tamaño de la cabeza y el canal pélvico aumenta el riesgo de distocia. En estos casos, la observación cuidadosa y la asistencia veterinaria son esenciales para garantizar el bienestar de la madre y sus crías.

EQUINO



La **estática fetal** normal es la **presentación anterior**, con la cabeza alineada y las extremidades anteriores extendidas. Esta posición favorece que el feto avance de forma gradual y al mismo tiempo contribuya a la dilatación del cuello uterino durante el parto. Alteraciones como la desviación de la cabeza, la flexión de rodillas o codos, o la retención de una extremidad provocan distocia grave debido al gran tamaño de la cría y la relativa rigidez del canal de parto de la yegua.

BOVINO



La **estática fetal** normal corresponde a la **presentación anterior**, con la cabeza y los miembros anteriores extendidos hacia el canal de parto. Dentro del útero, el feto suele encontrarse en una postura de "vago" con extremidades semiflexionadas, que al momento del parto deben extenderse de forma adecuada. En terneros pequeños, sobre todo en partos de vacas jóvenes, puede aceptarse la **presentación posterior**, aunque en animales adultos lo normal y seguro es la **presentación anterior**.

Importancia: la **estática fetal** es fundamental debido a que el canal pélvico es estrecho y la distocia es relativamente frecuente. Una **presentación o postura anormal** puede impedir la salida del becerro y poner en riesgo tanto al feto como a la madre, por lo que el diagnóstico y la corrección temprana de la **estática** son vitales en esta especie.

OVINOS y CAPRINOS



La **estática** es más común y favorable en la **presentación anterior** con la cabeza y extremidades bien proporcionadas respecto al canal pélvico. La postura normal es la flexión de las articulaciones, lo cual facilita el encaje y progresión del feto. Gracias a las proporciones corporales de corderos y cabritos, los partos suelen desarrollarse con menos complicaciones en comparación con bovinos y equinos.

Importancia: la **estática fetal** en pequeñas rumiantes es muy relevante sobre todo porque estas especies suelen tener partos múltiples. Una **alteración en la presentación** en la **postura** puede generar obstrucciones cuando 2 o + más fetos intentan salir al mismo tiempo.

Referencias Bibliograficas.

1. Dervaux, J. y Ectors, F. (1984). Fisiopatología de la gestación y obstetricia veterinaria; Zaragoza acribia.
2. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. (S.f) Estática fetal. En reproducción de los animales domésticos.