



UDS

MI UNIVERSIDAD

Docente:
Guillermo Montesinos Moguel

Alumno:
Adriana Yarisbeth Trujillo Oleta

Materia:
Fisiología de la reproducción animal II

ESTATICA FETAL.


La estatica fetal se refiere a la posición, presentación y actitud del feto dentro del canal del parto.

Bovino y Equino.

Parto normal: Longitudinal anterior, dorso sacro, cabeza y miembros anteriores extendidos.


Distocia: Por gigantismo fetal, torsiones uterinas, flexiones de cabeza o extremidades.

Importancia: El parto debe ser rápido, por que si retrasa pone en riesgo la vida de la cría.



Normal bovino

7




Ovino y Caprino

Parto normal: Longitud anterior, cabeza y miembros extendidos.

Distocia: Por múltiples fetos o mala colocación de cabeza.

Importancia: Atención rápida, evita pérdidas en crías valiosas.

Normal ovino




Distocia ovino

Canina y Felina

Parto normal: Anterior o posterior, dorso sacro, miembros extendidos.

Distocia: Fetos grandes, transversal, atonía uterina.

Importancia: Intervención inmediata (Cesárea).



Normal gata.



Distocia gata.




Cerda y Coneja

Parto normal: Longitud anterior o posterior (ambas son normales).

Distocia: raras; aparecen por exceso de crías.

Importancia: Por éstos pueden morir las crías.



Referencias:

- > Jackson, P. G. G. (2004). Hand book of veterinary obstetrics.
- > Arthur, G. H., Noakes, D. E., Pearson, H., & Parkinson, T. J. (2001). Obstetricia y reproducción veterinaria
- > Pugh, D. G., & Baird, A. W. (2013). Medicina de ovinos y caprinos.