

Epidemiología de Panleucopenia Felina

Definición { Es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el Parvovirus felino.

Etiología { Agente Causal { Parvovirus felino (FPV).
{ Persistencia { El virus es muy estable en el ambiente, puede sobrevivir meses en superficies contaminadas.

Fuente de Infección { Secreciones y excreciones de gatos infectados { Heces, orina, saliva y vómito

Vías de transmisión { Directa { Contacto entre gatos sanos y enfermos.
{ Indirecta { Fomites.

Huésped susceptible { Gatos jóvenes no vacunados, Gatos inmunosuprimidos o desnutridos.

Periodo { Incubación { De 2 a 7 días.
{ Transmisibilidad { Excreción viral.
{ Clínico { Suele ser agudo y corta duración y en gatos jóvenes puede provocar muerte súbita en 24 horas.

Vector { No existe vector biológico, ya que se transmite por contacto directo o indirecto.

Prevención { Vacunación, higiene, desinfección adecuada, fortalecimiento del sistema inmune y el control de ingresos de animales.

Huésped { - Gato doméstico.
{ - Gato silvestre.

Tratamiento { - Fluido terapia IV o SC para corregir deshidratación.
{ - Antieméticos para controlar vómito.
{ - Antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones secundarias.
{ - Aislamiento estricto del paciente para evitar la diseminación.