



CUADRO SINOPTICO SOBRE CRONOMETRIA DENTARIA DEL EQUINO

RAMOS OLVERA MONSERRAT

MVZ. García Sedano Barreda Roberto

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Zootecnia de equinos

Tapachula, Chiapas


27 de septiembre del 2025

CRONOMETRIA DENTARIA DEL EQUINO

Erupción de los incisivos de leche

La erupción de los dientes de leche empieza al nacer y termina a los 10 meses de edad.


- Pinza o palas entre 6 a 10 días de vida.
- Medianos entre 30-40 días de vida.
- Extremos entre 6-10 meses.



Rasamiento de los incisivos de leche.

Los dientes de leche permanecen hasta los 2 años de edad en donde empiezan a empujar los dientes definitivos o permanentes.

- Palas o pinzas rasana los 12 meses.
- Medianos rasana los 16-20 meses.
- Extremos rasana los 20-24 meses.



Erupción de los incisivos de adulto.

El diente a cambiado, cuando corta la encía. Desde ese momento hasta complementar su erupción pueden transcurrir unos 6 meses.

- Palas o pinzas cortan entre los 2 ½ y 3 años.
- Medianos cortan los 3 ½ y 4 años.
- Extremos cortan a los 4 ½ y 5 años.



Rasamiento de los incisivos

Se presenta una sobresaliente que aparece a los 7 años y desaparece a los 8, en algunos caballos reaparece a los 9. Los incisivos se producen 3 años más tarde que los inferiores.

- Pinzas o palas rasana los 6 años.
- Medianos rasana los 7 años.
- Extremos rasana los 8 años.



Forma circular de los incisivos

La superficie masticatoria en este periodo es circular, el diámetro transversal y el antero posterior son semejantes. Los medianos superiores rasana a los 11 o 12 años.


- Pinzas o palas comienzan a ser circulares a los 9 años.
- Medianos comienzan a ser circulares a los 10 años.
- Extremos comienzan a ser circulares a los 11-12 años.



Forma triangular o nivelamiento

Superficie masticatoria triangular con base labial entre 17-20 años. De 18 a 21 años, el diámetro anteroposterior es mayor, después de 21, los dientes se inclinan hacia delante y arcada se reduce.

- Pinzas o palas se vuelven triangulares a los 14 años.
- Medianos se vuelven a los 15 años.
- Extremos se vuelven triangulares a los 16-17 años.



BIBLIOGRAFIA

- <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=41b6344a596c5b676a250a812fb5f75bf7a76825187fa64a8014a580f46d6ea2JmltdHM9MTc1ODU4NTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12e98631-288c-6a28-14fc-95a229846beeb&psq=cronologia+dentaria+de+equinos+&u=a1aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0b3JpbY51bmljb3Jkb2JhLmVkdS5jby9zZXJ2ZXlvYXBpL2NvcmlUvYml0c3RyZWFTcy8zZjEwMTViNS1iZjNmLTRkZmQtODNkMi0xYmM5Nzg1ZmVkN2EvY29udGVudA>
- <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=adee216543945ad6b8e293a6381c1a39e1ee259e4a74bf0f5dcc9eeb0e2fed46JmltdHM9MTc1ODU4NTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12e98631-288c-6a28-14fc-95a229846beeb&psq=cronologia+dentaria+de+equinos+&u=a1aHR0cHM6Ly9lcY5zY3JpYmQuY29tL2RvY3VtZW50Lzg0NTk5OTlwNi9JQ1YtQ3Jvbm9sb2dpLWEtZGVudGFyaWEtZW4tZXF1aW5vcw>